

Stades

Avec des températures élevées et un ensoleillement maximum, la vigne poursuit son développement à un rythme soutenu. **Les baies atteignent régulièrement le stade « taille de pois » dans de nombreuses parcelles et « taille de plomb » dans les situations les plus tardives.**



Les grappes commencent à pendre, stade "baies taille de pois"

Pluies du 17 au 22 juin

Les averses orageuses du 18 juin n'ont concerné que quelques secteurs très localisés Gevingey et les Arsures, ne dépassant pas 1mm.

Les pluies de cette nuit et d'hier sont un peu plus conséquentes : de 3mm aux Arsures à 12,5mm à Maynal. Et ponctuellement plus importantes (plus de 25mm à Gevingey). Pas de pluie enregistrée sur la station de Pesmes pour cet épisode.

Prévisions du 25 au 30 juin :

Une dégradation semble se profiler à partir de jeudi soir avec des possibilités d'averses orageuses. Les températures devraient être proches des valeurs saisonnières. *Source Météo France*

Mildiou

> Situation au vignoble

La situation n'a pas évolué depuis la semaine dernière étant donné qu'aucun cycle n'était en cours. Le mildiou reste globalement rare dans le vignoble franc-comtois avec généralement quelques taches éparses. Ponctuellement, des taches plus régulières sont observées dans de rares parcelles. Seulement 2 symptômes de Rot Gris ont été détectés jusqu'à ce jour.



Mildiou sur grappe : Rot-Gris

Les pluies d'hier (23 juin) ont été potentiellement contaminatrices. Les taches théoriques correspondantes sortiront d'ici une semaine. Dans les parcelles où des taches éparses sont présentes, le risque sera plus important.

> Analyse de risque

Le risque demeure faible à moyen.

Oïdium

Le comptage sur feuilles de cette semaine indique que 60% des parcelles observées sont indemnes d'oïdium.

Dans les secteurs précoces, les comptages ciblent maintenant les grappes. La présence d'oïdium a été détectée dans 2 parcelles traitées (1 à 2% de grappes attaquées).

Par contre dans le témoin non traité du Vernois jusque-là peu touché, la dégradation en une semaine est significative : de 11% de feuilles attaquées à 49% et déjà 14% de grappes attaquées.

La situation oïdium évolue même si elle reste globalement saine.

Le modèle SOV détecte toujours une activité régulière du champignon.



Oïdium sur grappe

Jusqu'à fermeture, les grappes se situent dans une période de grande sensibilité vis-à-vis de l'oïdium.

Black-Rot

Peu d'évolution notée dans le vignoble ; les symptômes de black-rot sur feuilles sont rares. Quelques taches fraîches en secteurs sensibles.

Seules des taches éparses ont été détectées dans quelques nouvelles parcelles du vignoble.

Dans les parcelles exposées à cette maladie les années dernières, les grappes restent fortement sensibles jusqu'au stade fermeture. Rappelons que des contaminations significatives ne pourront avoir lieu que si des épisodes pluvieux importants se produisent.



Black-Rot sur Feuille

Rougeot

De rares taches de Rougeot ont été détectées dans de nouvelles parcelles hors secteur à historique de Cesancey.

Botrytis

Le stade fermeture de grappe est proche en parcelles précoces.

L'effeuillage est une technique qui a démontré tout son intérêt pour réduire les attaques de botrytis.

Vers de Grappe

Le vol de 2^{ème} génération s'intensifie sur cochylis. Il débute timidement sur quelques secteurs eudémis (Orbagna et Poligny).

Jusqu'à maintenant, les conditions chaudes et sèches n'ont pas été favorables à l'activité de ponte. Les comptages effectués jeudi dernier et hier n'ont pas permis de détecter de ponte.

Bois-noir

Les *Hyalesthes* (vecteur de cette maladie) ont débuté leur vol sur orties, les captures restent modérées mais de nombreux insectes sont observés sur leur plante hôte.

Parallèlement, le début de vol sur liseron a débuté mais reste très calme (1 seule capture en 8 jours).



Vecteurs du bois-noir sur une tige d'ortie

Cicadelle de la Flavescence Dorée

Les premières larves de stade L4 ont été observées dans le vignoble. Rappel : 5 stades larvaires avant apparition des adultes.

➤ **En pépinières** : la lutte a débuté et la couverture insecticide sera maintenue jusqu'à la disparition complète des adultes.

➤ **En parcelles de vigne-mères** de greffons et de porte-greffes. Le second traitement réalisé en fin de rémanence du premier doit être effectué jusqu'au 27 juin suivant la spécialité employée. Le troisième sera positionné plus tard pendant le pic des adultes.

Prochain BSV : mardi 01 juillet

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura – Coopérative Terre Comtoise – Interval - Vignoble Guillaume – Vignoble Champlitte

Avec la participation financière de :

