

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Viticulture n°8 du 28 mai 2013



Pluies du 21 au 27 mai :

Le Nord Beaujolais a été le secteur le moins arrosé avec 6 à 10 mm d'eau. Dans les autres secteurs, 15 à 20 mm ont été généralement relevés et localement jusqu'à 30 mm dans l'Yonne.

Prévisions du 29 mai au 03 juin :

Après l'unique journée ensoleillée de lundi, le temps est à nouveau à la pluie et à la fraîcheur. A quand le retour de l'anticyclone ?

Source Météo France

253 parcelles ont été observées dans le cadre du réseau BSV.

Stades

Avec la grande fraîcheur de la semaine passée, la pousse a été très réduite. Dans le meilleur des cas, on note 1 feuille étalée supplémentaire. Ainsi les stades vont de 2-3 feuilles étalées dans les situations les plus tardives à 8-9 feuilles dans les parcelles les plus précoces.

Les températures maximales relevées samedi ont péniblement dépassé les 10°C et les minimales ont frôlé les 0°C dans différentes situations. *A priori*, aucun dégât de gel significatif n'est noté. Seuls quelques bords de feuilles noircis ont été observés.

A ce jour, 2013 présente 2 à 3 semaines de retard par rapport à 2012 et à une année moyenne. A date équivalente en 2007, la vigne se situait fin floraison !



stade 2-3 feuilles
(FREDON Bourgogne)



stade 7-8 feuilles étalées
(CA21)

Mildiou

➤ Situation au 27 mai

Compte-tenu des températures très faibles, aucune évolution n'a été notée depuis la semaine dernière :

- les cycles postérieurs au 08 mai (contaminations des 09, 15, 18 mai et localement du 19-21 mai) ne se sont pas encore exprimés,
- les taches décelées la semaine dernière ne présentent toujours aucune ou très peu de sporulation, limitant ainsi les repiquages,
- les pluies notées sur les 7 derniers jours n'ont pas engendré de nouvelles contaminations.

Dans ces conditions, les 3 situations identifiées la semaine dernière restent d'actualité :

- Côte de Beaune, Beaujolais, Mâconnais Sud, Chalonnais Nord

Ces zones viticoles sont à l'heure actuelle les plus concernées par le mildiou. L'intensité des symptômes apparaît très variable selon les parcelles : d'une ou deux taches isolées à plusieurs taches par pied.

La Côte de Beaune se démarque avec 22% des situations du réseau BSV dans lesquelles du mildiou a été repéré. Ailleurs, le mildiou est moins fréquent.

- **Mâconnais Nord, Chalonnais Sud, Couchois, Côte de Nuits, Hautes Côtes, Yonne** : dans ces secteurs, seules quelques rares taches sont notées.

- **Nièvre** : à ce jour, il n'y a toujours aucun symptôme décelé.



Taches issues de contaminations
primaires (FREDON Bourgogne)

➤ Analyse de risque

Point positif, le passage en phase épidémique du mildiou ne s'est pas encore produit du fait des faibles températures et aucun repiquage significatif n'a eu lieu. Par ailleurs, même si les conditions de réalisation ont été souvent difficiles, une protection récente est maintenant en place dans l'ensemble du vignoble.

Néanmoins avec l'arrivée de nouvelles pluies et des températures un peu plus douces, le risque mildiou demeure globalement élevé et ponctuellement très élevé (Côte de Beaune en particulier).

L'épamprage qui est maintenant bien avancé dans certains secteurs contribue à diminuer l'inoculum et l'intensité des repiquages.

Oïdium

Le temps ensoleillé d'hier a permis de réaliser des observations plus précises.

Sur 118 parcelles observées, l'oïdium n'a été décelé que dans 6 situations de Chardonnay à fort historique oïdium (2 en 71, 3 en 21 et 1 en 89). Il ne s'agit que d'1 ou 2 taches à chaque fois.

Les conditions météorologiques fraîches et pluvieuses des jours à venir restent défavorables au champignon.

Le stade 7-8 feuilles étalées qui vient seulement d'être atteint en parcelles précoces, constitue le point de départ à partir duquel la lutte contre l'oïdium doit être prise en considération.



*Premières taches d'oïdium
(FREDON Bourgogne)*

Black-Rot / Rougeot

Pour le black-rot, excepté les 2 taches signalées la semaine dernière sur 1 parcelle dans l'Yonne, aucun nouveau symptôme n'a été observé sur la semaine écoulée dans le vignoble bourguignon.

Vers de Grappe

La situation n'a pas évolué depuis la semaine dernière. La fin du vol de cochylis est proche dans les situations les plus précoces. Les captures restent faibles à moyennes et les conditions fraîches et pluvieuses sont particulièrement défavorables à l'activité de ponte.

Pyrale

Depuis 3 semaines, aucune progression de ce ravageur n'est notée. Sa présence reste rare et les niveaux d'attaque atteignent tout au plus 25% de pieds occupés par au moins une pyrale (1 site sensible du Nord Côte d'Or) ce qui est bien en deçà du seuil d'intervention fixé à 80%.

Araignées rouges

Les conditions très peu poussantes de la semaine dernière ont été favorables à ce ravageur dans les parcelles concernées (Mâconnais, Côte de Beaune).

En cas de fortes infestations, la végétation est rabougrie et des nécroses apparaissent à la périphérie des feuilles.

Les ravageurs sont présents à la face inférieure des feuilles.

Si cela n'a pas déjà été fait, un comptage doit être réalisé rapidement. Rappelons que le seuil d'intervention est fixé à 70% de feuilles occupées par au moins une forme mobile d'acarien rouge. Une présence régulière de typhlodromes (0,5 à 1 individu en moyenne par feuille) suffit en général à assurer une maîtrise efficace des acariens phytophages.



Pointes du limbe noircies (CA21)



Prochain BSV : mardi 07 juin

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : SRAL, FREDON Bourgogne et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON Bourgogne - 110 VIGNE - BOURGOGNE DU SUD - BOURGOGNE VITI SERVICE - CAVE DES HAUTES COTES - COOPERATIVE AGRICOLE BRESSE MACONNAIS - COOPERATIVE AGRICOLE MACONNAIS BEAUJOLAIS - ECOVIGNE - GROUPEMENT VIGNERONS DES TERRES SECRETES - LA CHABLISIENNE - OENOPHYT - SEDARB - SICAVAC - SOUFFLET VIGNE - VITAGRI.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.