

# BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Viticulture n° 19 du 13 août 2013



150 parcelles ont été observées dans le cadre du réseau BSV.

## Stades

A l'exception du Beaujolais Saône et Loire où les premières baies vérees s'observent assez régulièrement, elles restent encore rares dans les autres vignobles. En secteurs tardifs, la vigne est toujours au stade fermeture.



1ères baies vérees  
(photo CA21)

## Mildiou

### ➤ Situation au 12 août

#### Sur feuilles :

Dans les secteurs où des pluies ont été enregistrées le 2 août, une nouvelle sortie de taches a été observée sur jeunes feuilles en fin de semaine dernière. Les contaminations liées aux pluies du 5 au 7 août commencent à s'extérioriser. La présence de taches de mildiou est maintenant très régulière et peut ponctuellement être importante.

Comme cela a déjà été le cas lors des épisodes précédents, l'intensité des symptômes est très variable d'une parcelle à l'autre selon l'état sanitaire antérieur, le type de produit utilisé et le moment du rognage. Ainsi, des parcelles dont la partie supérieure du feuillage est déjà très attaquée côtoient des vignes très peu touchées.

#### Sur grappes

La présence de rot brun reste globalement limitée. Toutefois, dans des parcelles où la maladie était déjà repérée sur grappes, une progression des symptômes est notée sur certaines parcelles, notamment en Saône et Loire. Des symptômes ont également été observés dans la Nièvre mais restent à des niveaux faibles. Ils sont à relier aux contaminations qui ont eu lieu lors des pluies de la dernière décade de juillet.

### ➤ Analyse de risque

**A la veille du début véraison, les grappes ne sont plus sensibles au mildiou. L'objectif est maintenant de préserver le feuillage dans son ensemble afin d'assurer une bonne maturation et une bonne mise en réserve (notamment pour les jeunes plantations).**

**La présence de nombreuses taches fructifiées au vignoble et les épisodes pluviométriques réguliers maintiennent le risque mildiou à un niveau élevé.**

**L'évaluation du risque pour la fin de campagne doit prendre en compte l'état sanitaire des parcelles et de leur environnement proche ainsi que les prévisions météo.**



### **Pluies du 05 au 12 août :**

Les pluies qui se sont produites entre le 5 et le 7 août selon les secteurs ont apporté des cumuls d'eau de 8 à 13 mm en Côte d'Or et dans le Couchois, 15 à 20 mm dans le Maçonnais et le Beaujolais et 15 à 30 mm dans l'Yonne.

### **Prévisions du 14 au 19 août :**

Un temps sec est annoncé pour cette semaine. Températures maximales comprises entre 23 et 28°C.

Source Météo France

## Oïdium

La situation n'a guère évolué depuis la semaine dernière. Près de 60% des parcelles sont encore indemnes d'oïdium sur grappes (62% le 5 août). Dans l'ensemble, la situation apparaît plus saine qu'en 2012 à stade équivalent.

Une évolution s'observe toutefois sur certaines parcelles qui présentaient déjà une attaque régulière d'oïdium la semaine dernière mais également sur certains secteurs tardifs jusque-là peu concernés.



*Oïdium sur baies  
(photo FREDEON Bourgogne)*

### ➤ Analyse de risque

Concernant la gestion de l'oïdium en fin de campagne, nous rappelons la règle de décision :

**Un bilan sanitaire doit être réalisé dans chaque parcelle en fin de rémanence du traitement effectué à fermeture (7 à 14 jours après fermeture selon la nature du fongicide utilisé) :**

- si absence d'oïdium : fin de risque de contaminations significatives sur grappes
- si présence même faible d'oïdium : le risque de progression de la maladie persiste jusqu'au début véraison.

Le comptage bilan est effectué sur 100 grappes (20 ceps x 5 grappes répartis sur l'ensemble de la parcelle). Cette observation doit être particulièrement méticuleuse et concerner toutes les parcelles de l'exploitation.

La pression 2013 apparaît globalement inférieure à celle de 2012 avec moins de cas « critiques » mais l'oïdium est localement bien implanté (en général parcelles à historique oïdium).

## Black-Rot

Quelques rares symptômes sur grappes sont notés dans des parcelles où des attaques significatives de black-rot ont déjà été enregistrées au cours des années précédentes.

Cette maladie est restée très discrète tout au long de la campagne aussi bien sur feuilles que sur grappes. La sensibilité des grappes vis-à-vis du black-rot devient nulle à partir de véraison.



*Les symptômes de  
black-rot sont très rares  
(photo FREDON Bourgogne)*

## Vers de Grappe

### ➤ 2<sup>ème</sup> génération :


Les vols de seconde génération sont terminés.

Le nombre de perforations reste faible en tous secteurs (moins de 8 perforations pour 100 grappes), seule une parcelle du réseau est signalée avec un nombre plus important de perforations (18 perforations pour 100 grappes dans l'Yonne).

**Comme en 2012, la pression vers de grappe 2<sup>ème</sup> génération aura été globalement nulle à faible dans tous les vignobles bourguignons.**

## Maladies du Bois

Les symptômes de maladies du bois (Esca/BDA) ont eu tendance à se développer ces dernières semaines de façon plus ou moins importante selon les secteurs. Un bilan des niveaux d'attaque sera réalisé dans l'ensemble des parcelles du réseau BSV avant vendanges.



## **Cicadelle Flavescence Dorée**

**Rappel Prospections** : à partir de fin août, des formations et des prospections seront organisées dans les différents vignobles de Bourgogne. Pour plus de précisions, se reporter à la plaquette de reconnaissance des symptômes et au planning joints dans le précédent bulletin.

Par ailleurs, rappelons que toutes les infos concernant la Flavescence Dorée sont disponibles sur le site : [www.stop-flavescence-bourgogne.fr](http://www.stop-flavescence-bourgogne.fr)

### **Ce BSV clôture la campagne 2013**

\*\*\*\*\*

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : SRAL, FREDON Bourgogne et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON Bourgogne - 110 VIGNE - BOURGOGNE DU SUD - BOURGOGNE VITI SERVICE - CAVE DES HAUTES COTES - COOPERATIVE AGRICOLE BRESSE MACONNAIS - COOPERATIVE AGRICOLE MACONNAIS BEAUJOLAIS - ECOVIGNE - GROUPEMENT VIGNERONS DES TERRES SECRETES - LA CHABLISIENNE - OENOPHYT - SEDARB - SICAVAC - SOUFFLET VIGNE - VITAGRI.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.