

# BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

BSV Cassis n° 1 du 22 mars 2011



écophyto2018

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos :  
moins, c'est mieux

## Stades

Noir de Bourgogne (en Plaine) : de B2 à C2  
Noir de Bourgogne (en Hautes Côtes) : de B2 à C2 également  
Blackdown (en Plaine) : de C1 à C3  
Andéga (en Hautes Côtes) : de C1 à C3

Ces stades sont très proches de ceux observés en 2010 à la même date, avec une très légère avance en Hautes-Côtes.

## Anthracnose

D'après les observations réalisées au microscope, sur des feuilles provenant d'une parcelle infectée l'an passé (Hautes-Côtes) et exposées aux conditions climatiques de Beaune, les formes de conservations sont déjà arrivées en début de maturité.

En revanche, les conditions climatiques prévues (absence de pluies) ne seront pas favorables aux contaminations.

On peut donc considérer le risque anthracnose comme faible à nul.

## Ravageurs

Pas de ravageur observé à ce jour.

Les stades théoriques de début de sensibilité aux différents ravageurs ne sont pas encore atteints.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON, à partir des observations réalisées par : CA 21 - SOUFFLET VIGNE - SRAL - FREDON.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.