

# BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

BSV Cassis n° 3 du 08 avril 2016



## Relevé des stades

Noir de Bourgogne : C3 à D selon les secteurs

Burga, Royal de Naples, Andéga, Blackdown : D à E1

Quelques fleurs déjà ouvertes observées en Royal de Naples.

Le début de floraison est à attendre à partir du début de semaine prochaine pour les secteurs les plus précoces, soit un peu plus tardif que 2015 et surtout que 2014, mais pas autant que 2013.

De nombreuses parcelles auront les 1ères fleurs qui s'ouvriront courant semaine prochaine, stade de début de sensibilité à certains ravageurs.



Stade E1 : 1<sup>er</sup> bouton dégagé.

F. Ecalle CA21

## Anthracnose

Étant donné que les formes de conservations sont maintenant à maturité, des projections peuvent se produire au cours de chaque période pluvieuse. Et toutes les parcelles ont maintenant atteint le stade minimal de début de sensibilité.

Suite aux pluies de dimanche et mardi dernier, des projections ont été effectivement mesurées par l'appareil installé à Beaune.

Un temps sec (absence de pluies et de rosées, vent orienté Nord) qui suit des projections peut empêcher les contaminations et l'apparition de symptômes.

Vu qu'actuellement l'humidité est présente quasiment chaque jour (rosée, averses) et que des averses pluvio-orageuses sont prévues semaine prochaine, le risque de contamination demeure très élevé.

À noter que les tout premiers symptômes ont été observés dans une parcelle au sud de la Côte d'Or.



## Chenilles

Déjà quelques pyrales et cheimatobies observées au niveau des boutons floraux dans 2 parcelles du val de Saône. Ces quelques individus isolés ne sont pas le signe d'un risque généralisé mais nous savons que les dégâts occasionnés par des chenilles sur les fleurs peuvent avoir un impact important sur le rendement. Le risque d'attaque débute dès le stade bouton dégagé et est au plus fort début floraison. La surveillance doit commencer dans les parcelles sensibles des secteurs précoces. Les attaques se produisent souvent par zone dans une parcelle, en particulier à proximité des haies et bois.

## Pucerons

Pas encore de pucerons verts observés mais quelques individus isolés de pucerons jaunes, ces derniers étant habituellement peu préjudiciables.

## Chenilles

Pas de larves observées à ce jour. Le stade repère est le stade F1 en BD. Il est donc probable d'observer les 1<sup>ères</sup> larves au cours de la semaine prochaine dans les secteurs où cette variété sera en début floraison. Les jeunes parcelles à proximité de vergers en production et surtout les rangs en repousse après broyage sont sensibles.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche-Comté et rédigé par la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON, à partir des observations réalisées par : CA 21 - CA 71 - FREDON.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

« Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 »