

BULLETIN de SANTE du VEGETAL

FRANCHE COMTE

Bulletin N°11 – Semaine 24 – 2 pages

Stades

Les fortes températures des derniers jours ont permis une évolution très rapide des stades. Ceux-ci s'étalent entre début floraison à nouaison. **Le stade majoritaire étant fin floraison à début nouaison.** Dans les situations les plus précoces, les baies atteignent déjà 2 à 3 mm.

Au niveau précocité, **2014 présente actuellement 4 à 6 jours d'avance par rapport à une année moyenne.**



Stade fin floraison, début nouaison

Pluies du 02 au 09 juin

La semaine écoulée a été marquée par un seul épisode pluvieux le 04 juin qui a apporté de 6 à 21 mm dans les différents secteurs du vignoble franc-comtois.

Prévisions du 12 au 16 juin :

L'instabilité s'éloigne et un temps toujours sec et ensoleillé devrait prédominer. Les températures devraient être moins élevées et se rapprocher des normales de saison.
Source Météo France

Mildiou

➤ Situation au vignoble

- **Vignoble jurassien** : quelques nouvelles taches issues des contaminations du 26 mai sont apparues fin de semaine dernière. Toutefois la situation du vignoble reste à ce jour saine.

- **En Haute-Saône**, la maladie n'a toujours pas été décelée.



Tache fraîche de mildiou

Les contaminations potentielles du 04 juin sont arrivées en fin d'incubation, mais les fortes chaleurs diffèrent l'apparition des symptômes.

L'épisode orageux d'hier soir a probablement entraîné de nouvelles contaminations. (plus d'info dans le prochain BSV).

➤ Analyse de risque

Compte tenu de la présence de taches éparses, le risque peut être qualifié de moyen dans le vignoble jurassien.

En Haute-Saône, la quasi absence de symptômes place le risque à un niveau faible à très faible.

En tous secteurs, seule une succession de pluies significatives serait susceptible de faire évoluer ce risque.

Néanmoins un minimum d'attention devra être maintenu dans cette période de forte sensibilité des grappes au mildiou.

Oïdium

Dans les parcelles traitées, la situation est relativement stable par rapport à la semaine dernière. Seul le témoin non traité du Vernois a progressé (de 2 à 11% de feuilles attaquées).

En parcelles traitées, à l'exception de quelques parcelles très touchées, la situation reste très saine. De nouvelles parcelles avec 1 ou 2 taches ont également été détectées.



Feutrage gris : oïdium sur grappe

En toutes situations la vigne est maintenant dans la période de grande sensibilité à l'oïdium

Black-Rot

A l'exception du secteur de Mesnay et Villette-les-Arbois, aucun autre symptôme n'a été observé depuis.
La période où les grappes sont les plus réceptives aux contaminations débute à partir du stade floraison-nouaison.

Botrytis

Le stade chute des capuchons floraux à baies de 2-3 mm est atteint dans bon nombre de situations de Chardonnay, Poulsard et Pinot noir. Ce sera le cas en fin de semaine pour les autres cépages.
L'effeuillage précoce à nouaison constitue une mesure prophylactique qui a démontré tout son intérêt dans la prévention des attaques de botrytis. Pour les parcelles sensibles à la coulure, il est préférable d'attendre le stade "baie à taille de pois".

Vers de Grappe

Les derniers comptages réalisés montrent une recrudescence des vers de la grappe cette année. Dans le réseau BSV, une majorité de parcelles (64%) ont une attaque comprise entre 10 et 49 toiles pour 100 grappes. Dans ce réseau, aucune parcelle ne dépasse les 50 glomérules pour 100 grappes, pour autant ailleurs dans le vignoble ces taux sont atteints ponctuellement.

Les secteurs les plus concernés sont : Les Arsures, Montigny, Arbois. Ailleurs, de nombreuses parcelles dépassent 10% de glomérules.

Cependant même si la fréquence de parcelles touchées s'avère supérieure aux dernières années, le seuil d'intervention en 1ère génération n'est dépassé que localement.



Larve de cochylys

Le vol de 2^{ème} génération devrait débiter d'ici fin de semaine en secteurs précoces.

Cicadelle de la Flavescence Dorée

➤ **En pépinières** : la lutte a débuté et la couverture insecticide sera maintenue jusqu'à la disparition complète des adultes.

➤ **En parcelles de vigne-mères** de greffons et de porte-greffes. Le premier traitement a dû être réalisé. Le second sera fait en fin de rémanence de ce dernier.

Cochenilles

Très ponctuellement des symptômes de cochenilles sont observés . ceux-ci vont de quelques ceps à plus de 15% des ceps.

Les essaimages de larves de cochenille n'ont, à ce jour, pas commencé.



Symptômes : pousses chétives, feuilles brillantes et craquantes, présence de cochenilles et fourmis

Prochain BSV : mardi 17 juin

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura – Coopérative Terre Comtoise – Interval - Vignoble Guillaume –Vignoble Champlitte

Avec la participation financière