BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 8 du 08 juin 2012

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE BOURGOGNE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE
DRAAF - SRAI

Horticulture

Bulletin de santé du végétal
écophyto2018

écophyto2018
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos : moins, c'est mieux

Les abeilles butinent, protégeons les ! Respectez la réglementation « abeilles » et lisez attentivement la note nationale BSV 2012 sur les abeilles

Dans les situations proches de la floraison des arbres fruitiers, des parcelles légumières, ou horticoles, lors de la pleine floraison, ou lorsque d'autres plantes sont en fleurs dans les parcelles, utiliser un insecticide ou acaricide portant **la mention « abeille », autorisé « pendant la floraison mais toujours en dehors de la présence d'abeilles » et intervenir le soir par température <13°C (et jamais le matin)** lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préserver ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés.

Attention, la **mention « abeille » sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le produit est inoffensif pour les abeilles**. Cette mention « abeille » rappelle que, appliqué dans certaines conditions, le produit a une toxicité moindre pour les abeilles **mais reste potentiellement dangereux**.

Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d'intervalle en appliquant l'insecticide pyréthrinoïde en premier.

N'intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions d'emploi associées à l'usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique (ou l'étiquette) livrée avec l'emballage du produit.

Lors de la pollinisation (prestation de service), de nombreuses ruches sont en place dans les vergers et les cultures légumières. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles, mais aussi dans les parcelles voisines ont un effet toxique pour les abeilles. **Veiller à informer le voisinage de la présence de ruches.**

Pour en savoir plus : téléchargez la plaquette *« Les abeilles butinent »* et la note nationale BSV *« Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les ! »* sur les sites Internet partenaires du réseau d'épidémiosurveillance des cultures ou sur *www.itsap.asso.fr*

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
BOURGOGNE
PRODUCTIONS HORTICOLES n° 8 du 08 juin 2012

Les Pucerons sur plantes à massif : peu présents

Les serres se vident et les pucerons ne sont plus guère présents dans les exploitations.
Mais attention à bien procéder à un vide sanitaire avant de commencer la culture du chrysanthème.

THRIPS sur plantes à massif : peu présents

Malgré les températures clémentes, les thrips sont peu présents.
Il faut rester très vigilant pour les prochaines cultures.

ALEURODES sur fuchsia : toujours des cas mentionnés

Avec le retour des températures clémentes sous les serres, la présence d'aleurodes sur fuchsia se confirme.
A surveiller.

MILDIOU Impatiens walleriana

Photo ADHP
Jeunes plants d'Impatiens attaquées par le mildiou

Des cas de mildiou sur Impatiens walleriana sont encore signalés dans les exploitations.
Le développement de ce champignon est fortement lié aux conditions climatiques. Toutes les variétés d'Impatiens walleriana sont sensibles.

TOUTES les cultures fraîchement empotées

Des risques de présence de larves de sciarides

Photo ADHP
Larve de sciaride

Quelle que soit la période des empotages des jeunes plants, la présence de sciarides est toujours à craindre.
Les boutures de chrysanthèmes et les jeunes plants de cyclamen arrivent actuellement dans les exploitations.
Il faut donc rester vigilant.

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
BOURGOGNE
PRODUCTIONS HORTICOLES n° 8 du 08 juin 2012

VU DANS LES EXPLOITATIONS : Entyloma gaillardianum

(Photos ADHP)

Description des symptômes

Des taches circulaires blanchâtres apparaissent sur le feuillage. L'infestation commence par les feuilles les plus basses. Ces taches deviennent plus foncées en vieillissant et le centre de la tache finit par tomber.
Il faut éviter d'arroser la plante par le dessus et faciliter le séchage rapide des plants.

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque
VEILLER à bien nettoyer les serres avant de mettre en culture les chrysanthèmes et les cyclamens

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Pucerons	Boutures diverses	
Sciaride	Boutures diverses	
Thrips	Boutures diverses	
Aleurodes	Fuchsia	
Acariens	Géranium lierre	
Pucerons	Géranium lierre	
Thrips	Géranium lierre	
Botrytis	Géranium zonal	
Pucerons	Géranium Zonal	
Mildiou	Impatiens walleriana	

Légende
Aucun risque
Risque moyen à surveiller
Risque important

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des observations réalisées par ADHP.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 »

Avec la participation financière de : ONEMA Office national de l'eau et des milieux aquatiques