

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

PRODUCTIONS HORTICOLES n° 17 du 12 décembre 2014



Toujours beaucoup de botrytis sur primula acaulis et sur les cultures de bisannuelles ainsi que sur les pieds mères de géranium



Photo AREXHOR G.E.

Toutes les cultures conduites à froid et à forte densité dans des plaques de distançage sont concernées par des attaques de botrytis. Faciliter la circulation de l'air entre les pots permet de limiter le développement de ce champignon. De même un nettoyage des parties atteintes fleurs ou feuilles réduit l'expansion de ce champignon très polyphage.

Poinsettia : apparition de quelques aleurodes en fin de culture



Photo FLHOREAL—Aleurode adulte sur poinsettia

Parmi les deux espèces rencontrées sous serre, *Bemisia tabaci* pose le plus de problème en présentant davantage de résistance que l'espèce *Trialeurodes vaporariorum*. Très polyphages, ces insectes piquent et vident les cellules végétales grâce à leur rostre. En cas de forte infestation, la fumagine est un champignon qui se développe sur les sécrétions sucrées de miellat et qui déprécie fortement la valeur des plantes.

VU DANS LES SERRES : pupes d'aleurodes parasités

Puparium
Trialeurodes vaporariorum



Puparium parasité par
Encarsia formosa

Puparium
Bemisia tabaci

Pupariums d'aleurodes
parasités (FLORHEAL)

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2014

Horticulture

Douceur du printemps: pucerons très tôt dans toutes les cultures

Fusariose sur cyclamen et dépérissement racinaire sur Primula

Maladies: botrytis et oïdium
Ravageurs: pucerons et thrips

Puceron parasité par un champignon

Pucerons noirs sur chrysanthème

Dégâts foliaires dus aux thrips

Acariens

Avec le printemps doux, les pucerons sont apparus très tôt sous les serres. Aucune culture n'a été épargnée. En effet après la gamme de printemps ce sont les cultures de chrysanthèmes qui ont été la proie des pucerons noirs. Les thrips ont été présents de façon hétérogène dans les cultures. Les primevères de jardin de même que les cyclamens ont souffert de ces températures trop élevées.

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Beaucoup d'attaques de botrytis sur primula acaulis et bisannuelles

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Fusariose	Cyclamen	
Pucerons	Cyclamen	
Sciarides	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	
Botrytis	Géranium pieds mères	
Botrytis	Pensées	
Mildiou	Pensée	
Oïdium	Pensée	
Pucerons	Pensée	
Botrytis	Primula	
Pucerons	Primula	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

NOTE NATIONALE BSV

Limaces : surveiller, prévenir les risques et privilégier les méthodes de lutte intégrée

[Téléchargez](#)

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne et rédigé par AREXHOR Grand-Est, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON Bourgogne, à partir des observations réalisées par ADHP.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'Agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 »