


BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Viticulture n°2 du 14 avril 2015



Stades




Pointe verte

Les conditions actuelles sont très favorables au développement de la végétation. Les stades évoluent rapidement et se situent entre bourgeon dans le coton et éclatement du bourgeon, voire 1^{ère} feuille étalée dans les situations les plus précoces.

Mange-bourgeons

Mange-Bourgeons Fréquence de ceps attaqués sur le réseau BSV Bourgogne 2015



Malgré une petite évolution de la fréquence de parcelles touchées, les dégâts de mange-bourgeons restent limités sur le réseau. 69% des parcelles demeurent indemnes et seules 2% des situations approchent ou dépassent le seuil de nuisibilité (valeurs maximales : 20 et 25% de ceps atteints pour 1 parcelle en Côte d'Or et 1 en Saône et Loire).

Rappel : le seuil d'intervention est fixé à 10-15 % de ceps avec au moins un bourgeon mangé.

Les mange-bourgeons sont susceptibles de provoquer des dégâts jusqu'au stade 1^{ère} feuille étalée. Compte tenu des prévisions météorologiques, un certain nombre de parcelles auront atteint ou dépassé ce stade d'ici le début de la semaine prochaine.

Bulletin
de santé
du végétal
ÉCOPHYTO

ÉCOPHYTO
RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS



Pluies du 07 au 12 avril :

En dehors de quelques gouttes le 11 avril au matin, aucune pluie significative n'a été notée sur le réseau au cours des 7 derniers jours.

Prévisions du 15 au 20 avril :

De belles conditions vont perdurer jusqu'à jeudi avec des températures quasi estivales.

Après un risque orageux vendredi, le beau temps devrait faire son retour avec des températures plus conformes aux normales saisonnières.

Source Météo France

Excoriose



*Symptômes d'excoriose (CA21)
Nécroses brunes-noirâtres
à la base des rameaux*

Les observations excoriose effectuées dans la Nièvre confirment le bilan dressé la semaine dernière dans les autres vignobles, à savoir une très faible présence de la maladie.

Rappel : l'éclatement du bourgeon (stade 06) constitue le stade clé dans la gestion du risque vis-à-vis de l'excoriose. Des contaminations significatives sur les futurs rameaux ne pourront avoir lieu que si les conditions suivantes sont réunies :

- parcelles présentant plus de 10% de ceps atteints,
- stade 06 observé dans ces parcelles,
- pluies survenant durant la période d'éclatement des bourgeons.

Dans les rares parcelles où des symptômes significatifs d'excoriose ont été identifiés et qui auront atteint le stade éclatement en fin de semaine, des contaminations ne pourront avoir lieu que si les pluies annoncées pour vendredi se produisent réellement.

Vers de Grappe

Conformément aux prévisions, les premiers papillons de cochylys ont été capturés hier dans les pièges disposés en secteurs précoces. Avec les températures élevées, le vol de 1^{ère} génération devrait s'intensifier dans les prochains jours.

Pour la confusion sexuelle, les chantiers de pose des diffuseurs sont en cours.

Mildiou

Maturité des œufs d'hiver

Rappelons que la maturité des œufs d'hiver est considérée acquise lorsque leur germination en milieu contrôlé (20°C et humidité saturante) a lieu en moins de 24 heures.

Dans les vignobles de Côte d'Or, de l'Yonne et de la Nièvre, le temps de germination n'a pratiquement pas évolué depuis la semaine dernière et reste égal ou supérieur à 3 jours. Dans tous ces secteurs, malgré la pluie annoncée vendredi, il n'y a aucun risque de contaminations pour le moment.

Dans le vignoble de Saône et Loire, la maturité n'était toujours pas acquise en date du 13 avril. De nouveaux suivis sont en cours. En secteurs précoces, cette maturité pourrait être atteinte très prochainement. Dans ce cas de figure, la pluie annoncée vendredi pourrait être à l'origine des premières contaminations dans les vignes ayant atteint ou dépassé le stade de début de réceptivité à la maladie (éclatement du bourgeon). Ceci à condition que les hauteurs d'eau soient suffisantes. Un point plus précis sera fait dans le prochain BSV.



Black-Rot

Maturité des périthèces

A ce jour, la maturité des périthèces n'est atteinte sur aucun des sites de suivi dans le vignoble bourguignon.

Prochain BSV : mardi 21 avril

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : SRAL, FREDON Bourgogne et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON Bourgogne - 110 VIGNE - BOURGOGNE DU SUD - BOURGOGNE VITI SERVICE - CAVE DES HAUTES COTES - COOPERATIVE AGRICOLE BRESSE MACONNAIS - COOPERATIVE AGRICOLE MACONNAIS BEAUJOLAIS - ECOVIGNE - GROUPEMENT VIGNERONS DES TERRES SECRETES - LA CHABLISIENNE - OENOPHYT - SEDARB - SICAVAC - SOUFFLET VIGNE - VITAGRI.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec la participation financière de :

