

FRANCHE COMTE

Bulletin N° 14 – Semaine 28 – 2 pages

Pluies du 06 au 12 juillet :

L'épisode orageux du 10 juillet est resté très localisé et celui du 12 juillet a été plus généralisé.

Pluviométrie du samedi 10 et lundi 12 juillet (stations Interval et Météo France) :

	10 juillet	12 juillet
Maynal	0 mm	nc
Orbagna	0 mm	9 mm
Montmorot	0 mm	10,9 mm
L'Etoile	0 mm	10,5 mm
Le Verinois	0 mm	9,5 mm
Pupillin	7 mm	7 mm
Arbois	4,8 mm	8,6 mm
Les Arsures	3,5 mm	8 mm

Prévisions du 14 au 19 juillet

Le début de cette période va être marqué par une alternance de soleil et d'averses orageuses qui pourront apporter localement de forts cumuls d'eau.

Les températures moins étouffantes ne seront que temporaires. Dès vendredi, les valeurs repartiront à la hausse et atteindront 30°C pour les maximales. Le week-end marquera le retour d'un temps agréable, ensoleillé et sec. Le vent sera faible hors rafales sous orage.

Indice de confiance : **4/5 puis 3/5** - Source Météo France

Stades

Sous l'influence d'une longue période ensoleillée et de températures élevées, la vigne a poursuivi son développement à un rythme soutenu. Dans bon nombre de parcelles, le stade fermeture de grappe est maintenant atteint. Dans les secteurs les plus tardifs, c'est encore le stade "pré-fermeture" qui prédomine.

Mildiou

Situation au vignoble au 12 juillet

Dans le réseau, aucune évolution n'est notée. Le mildiou se limite toujours à quelques taches éparses et quelques symptômes sur grappes. Cependant des parcelles fortement touchées sur feuillage voient les symptômes sur grappes évoluer.

Le point sur les contaminations en cours

Là où il a plu samedi 10 juillet, des contaminations significatives ont pu avoir lieu à partir du moment où la sporulation a été effective, tout comme les pluies de la fin de journée du 12 juillet généralisées sur le vignoble. Chaque nouvelle pluie à venir est susceptible de provoquer de nouvelles infections.

Le stade fermeture, qui marque la fin de la période de forte sensibilité des grappes, est atteint dans bon nombre de parcelles. Dans ces situations, l'objectif est maintenant d'assurer une protection du feuillage et particulièrement de la jeune végétation très réceptive au mildiou. Dans les secteurs plus tardifs, les grappes demeurent encore sensibles aux attaques du champignon.

Oïdium

Les parcelles du réseau, 12 sur 14 au total, comptabilisent moins de 5% de symptômes sur grappes. Ceci signifie que l'état sanitaire vis à vis de l'oïdium demeure tout à fait satisfaisant dans une grande majorité de situations. Cependant, on observe une évolution de la maladie, notamment les parcelles avec défaillance de traitement où à historique (jusqu'à 30% de grappes atteintes).

Le stade fermeture marque l'entrée dans une période de moindre réceptivité des grappes à de nouvelles contaminations de l'oïdium. Ceci n'exclut pas que l'attaque continue à évoluer sur grappes à la faveur de contaminations antérieures.

Des comptages réguliers doivent être maintenus pour suivre l'évolution de la maladie et définir en conséquence le risque encouru par la parcelle.

Black-rot

Une évolution des symptômes sur le feuillage n'a été notée que très ponctuellement dans quelques parcelles du vignoble. Ailleurs, la stabilité est de mise sur les 7 derniers jours. Aucun symptôme sur grappes a été enregistré. Le niveau d'attaque reste très limité à ce jour.

Dans la plupart des parcelles, le stade fermeture est atteint, marquant la fin de la période de risque sur grappes. L'attaque peut malgré tout évoluer, puisqu'il est possible que des contaminations antérieures à ce stade soient encore en incubation.

Rougeot

Avec l'arrêt des projections de spores de rougeot parasitaire, nous arrivons à la fin de la période de risque vis à vis de cette maladie.

Vers de Grappe

Vols :

- **Cochylis** : le vol de cochylis est déclin dans les secteurs les plus précoces (Voiteur, Arbois).
- **Eudémis** : les captures d'eudémis restent faibles à inexistantes.

Pontes :

Dans tous les cas, la présence d'œufs concerne un nombre très limité de parcelles. Le potentiel reste faible avec au plus 2 œufs pour 100 grappes. Ces œufs sont issus de cochylis et des premières pontes d'eudémis.

Flavescence dorée

Les premières cicadelles de la Flavescence Dorée adultes n'ont pas encore été observées dans le vignoble jurassien.

Prochain BSV : mardi 20 juillet

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Franche-Comté et rédigé par la Société de Viticulture du Jura en collaboration avec la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le SRAL Bourgogne, à partir des observations réalisées par : Société de Viticulture du Jura – Coopérative Terre Comtoise - Interval

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAFC dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.