

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL BOURGOGNE

Viticulture n°18 du 02 août 2016



STADES



Fermeture à
Fermeture + 15 jours

Avec la poursuite d'un temps estival, les stades végétatifs se répartissent désormais entre veille de fermeture et fermeture + 15 jours. Dans les situations les plus précoces, les toutes 1^{ères} baies vérées commencent à être visibles.

ALEAS CLIMATIQUES

Grêle : nouvel épisode de grêle samedi 30 juillet sur le sud du Mâconnais et le Nord Beaujolais (Vergisson, Saint Amour Bellevue...). Les premières estimations de dégâts sur grappes montent jusqu'à 15-20 %.

MILDIU

► Point contaminations

✓ **Sur feuilles** : à ce jour, seule la contamination du 30 juillet, qui a affecté principalement le sud Saône et Loire, ne s'est pas encore extériorisée. Les symptômes correspondants pourraient faire leur apparition à partir de cette fin de semaine. Ailleurs, il n'y a plus de cycle en cours.

✓ **Sur grappes** : là où elles se sont produites, les contaminations des 22-24 juillet arrivent en fin d'incubation cette semaine. Si des symptômes apparaissent, ils devraient concerner principalement les situations tardives ou déjà bien affectées.

La contamination du 30 juillet devrait être d'intensité limitée, étant donné le stade déjà avancé des grappes dans les secteurs concernés.

► Situation au vignoble

✓ **Sur feuilles** : dans une grande majorité de situations, très peu de nouvelles taches ont été observées depuis la semaine dernière. Néanmoins, localement, de nouveaux symptômes sont notés sur jeunes feuilles. Il s'agit le plus souvent de parcelles déjà fortement concernées par la maladie.

✓ **Sur grappes** : très peu d'évolution constatée sur les 7 derniers jours, mis à part dans des vignes déjà très impactées où le rot brun progresse encore.

► Analyse de risque :

Hormis quelques passages pluvieux, les conditions climatiques actuelles sont défavorables à la maladie. Par ailleurs, les grappes sont maintenant bien moins sensibles à de nouvelles attaques. **Dans ce contexte, le risque est en baisse et peut être qualifié de moyen.**

Il faut toutefois garder à l'esprit l'objectif de fin de saison qui va être de préserver le feuillage jusqu'aux vendanges, avec le point délicat cette année d'une présence généralisée et très forte du mildiou.

Pluies du 26 au 31 juillet :

L'orage du 30 juillet a ciblé principalement le sud Saône et Loire. Dans ce vignoble, on relève de 8 à 13 mm. Ailleurs, on enregistre tout au plus 3 mm au cours des 7 derniers jours.

Prévisions du 03 au 08 août :

Après une évolution orageuse jeudi et vendredi, le temps revient au beau à partir de fin de semaine avec des conditions à nouveau estivales qui devraient s'installer à nouveau durablement.

Source Météo France




Météo

OïDIUM

Oïdium

Fréquence de grappes atteintes
sur le réseau BSV Bourgogne 2016



A ce stade, 62% des parcelles du réseau restent indemnes d'oïdium. Toutefois, une diminution des parcelles non atteintes est notée de semaine en semaine, avec une situation contrastée selon les secteurs :

✓ **Saône et Loire et Côte d'Or** : une évolution continue d'être observée principalement dans des parcelles à historique et/ou présentant des symptômes depuis plusieurs semaines. Dans certains cas, l'attaque peut être très importante à la fois en fréquence de grappes impactées et en intensité.

✓ **Yonne et Nièvre** : la maladie reste toujours discrète jusqu'à maintenant.

➤ **Analyse de risque :**

Les conditions climatiques restent favorables au champignon comme l'indique le modèle SOV.

Même si les grappes deviennent progressivement moins réceptives, une surveillance régulière des parcelles est nécessaire.

Le risque reste élevé.

Rappel concernant la gestion de l'oïdium en fin de campagne :

Un bilan sanitaire doit être réalisé dans chaque parcelle en fin de rémanence du traitement effectué à fermeture (10 à 14 jours après fermeture selon la nature du fongicide utilisé) :

- si absence d'oïdium : fin de risque de contaminations significatives sur grappes.
- si présence **même faible** d'oïdium (quelques baies) : le risque de progression de la maladie persistera jusqu'à véraison.

Le comptage bilan sera effectué sur 100 grappes réparties sur l'ensemble de la parcelle. Cette observation devra être particulièrement méticuleuse et concerner **toutes** les parcelles de l'exploitation pour que la règle de décision puisse être appliquée.

BLACK-ROT

Pas d'évolution. A ce jour, aucun symptôme sur grappes n'a été constaté. Rappelons que les grappes sont sensibles jusqu'à début véraison.

BOTRYTIS

La fermeture de grappe est atteinte dans la majorité des parcelles du vignoble bourguignon. Des symptômes de botrytis continuent à être observés çà et là.

VERS DE GRAPPE

Le vol de cochylys est désormais terminé en tous secteurs ; celui d'eudémis se poursuit avec des captures qui restent faibles.

L'activité de ponte reste globalement très limitée, excepté dans quelques situations de l'Yonne où l'on détecte jusqu'à 19 pontes pour 100 grappes.

De même les perforations sont le plus souvent peu nombreuses, sauf situations particulières (max 32 perforations pour 100 grappes en Côte Chalonnaise).



Perforation

CICADELLE FD

Dans les communes à 3-1 traitements, le premier relevé des pièges permettant de décider de la nécessité ou non d'effectuer le troisième traitement a été réalisé hier par la FREDON et la CA 71. Le message réglementaire de la DRAAF diffusé ce jour est joint.

Le seuil de traitement n'est atteint dans aucune des 17 communes de la zone 3-1 située dans le nord Mâconnais. Le second relevé des pièges est programmé le 10 août, le message réglementaire correspondant sera diffusé dans la matinée du 11 août sur le site de la DRAAF.

Dans les vignes mères de greffons, le 3^{ème} traitement doit être positionné au pic de la présence des adultes. Son application devra intervenir sur la période s'étalant du 4 au 11 août.

En pépinières, la protection insecticide sera maintenue jusqu'à la disparition des adultes.

Prochain et dernier BSV de la campagne 2016 : mardi 09 août

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne (CRAB) et rédigé par le représentant de la CRAB en collaboration avec les membres de la cellule analyse de risque : SRAL, FREDON Bourgogne, IFV et GIE BFC-Agro à partir des observations réalisées par : CA21 - CA71 - CA89 - ESPACE VIGNE - FREDON Bourgogne - 110 VIGNE - BOURGOGNE DU SUD - BOURGOGNE VITI SERVICE - CAVE DES HAUTES COTES - COOPERATIVE AGRICOLE BRESSE MACONNAIS - COOPERATIVE AGRICOLE MACONNAIS BEAUJOLAIS - ECOVIGNE - GROUPEMENT VIGNERONS DES TERRES SECRETES - LA CHABLISIENNE - OENOPHYT - BIO BOURGOGNE - SICAVAC - SOUFFLET VIGNE - VITAGRI.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRAB dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Avec la participation financière de :