

FRANCHE COMTE

Bulletin N° 15 – Semaine 24 – 2 pages

Disponible sur le site : <http://www.franche-comte.pref.gouv.fr/agriculture-h395.html>

BLE

Stades

De grain laiteux à grain pâteux.

Maladies

Les premiers symptômes de fusariose sont visibles sur épi (voir photo).

Photo : fusariose sur épi



FREDON

Pucerons des épis

Les pucerons sont toujours très peu présents.

La période de sensibilité se termine au stade grain pâteux. Risque faible.



TOURNESOL

La majorité ont atteint ou dépassé le stade bouton étoilé.

Pucerons

Risque terminé.

Mildiou (voir note commune BSV N°12)

En cas d'attaque, penser à nous le signaler afin de déterminer les races présentes en Franche Comté.

MAIS

Les premiers semis sont au stade 10-11 feuilles (hauteur 80 cm). La majorité des parcelles est au stade 8-9 feuilles.

Pyrale

Aucune nymphose (transformation de la chenille en chrysalide) n'a été observée dans les cages d'élevage situées à :

- Dannemarie sur Crête 25 (lycée agricole)
- Chemin 39 (coopérative INTERVAL)

Captures pyrales – pièges à phéromones

Dpt	Commune	Captures pyrale au 08/06/09
JURA	La Loye	1 (02/06)
	Annoire	0
	Desnes	1
	Vaudrey	1
	Evans	0
DOUBS	St Julien les Montbéliard	1
	Rignosot	1
HAUTE SAONE	Chenevrey	0
	Montureux les Gray	0

Les premiers papillons ont été capturés simultanément sur toute la Franche-Comté, ce n'est que le tout début du vol. L'année 2009 s'annonce précoce.

Les conditions sèches de la semaine précédente n'ont pas réellement été très favorables à la nymphose. La pluie du Week End tant attendue et les températures plutôt estivales annoncées pour le Week End prochain devraient permettre au vol de se confirmer.

Aucune ponte observée sur 3 parcelles à risque visitées dans le Jura. Le risque est faible. Attendre le prochain bulletin.



Pucerons

Pas d'évolution, les **pucerons** sont toujours très rares, moins de 10% de pieds touchés avec de très petites colonies (5 à 10 pucerons).

Les auxiliaires sont toujours présents. Risque faible.



SOJA

Vanesse

La surveillance des parcelles est toujours d'actualité, leurs présences et leurs nombres sont très variables.

Dans le Jura, le nombre de chenilles est bien souvent inférieur à une par pied mais peut dépasser parfois les 5 individus par pied. Alors que dans certaines parcelles, les chenilles ont disparu, dans d'autres, les populations augmentent en quelques jours.

En Haute Saône, les infestations sont globalement plus importantes que la semaine dernière sans toutefois dépasser 1 chenille par pied.

Surveiller les parcelles.

