



SOMMAIRE

P. 2 Météo

P. 2 Biodiversité et santé des agrosystèmes

P. 3 Maïs

P. 9 Adventice et liens utiles

A RETENIR

Maïs :

- Stade : floraison atteinte pour les premiers semis de début avril.
- Pas de risques pucerons.
- Pyrale : pic de vol dépassé.
- Chrysomèle : des premier piégeages très précoces.

METEO

Prévision à 7 jours

JEUDI 02	VENDREDI 03	SAMEDI 04	DIMANCHE 05	LUNDI 06	MARDI 07	MERCREDI 08
						
14° / 30°	15° / 29°	14° / 31°	14° / 32°	18° / 32°	18° / 29°	18° / 28°
↘ 15 km/h	↗ 20 km/h 40 km/h	↗ 15 km/h	↖ 15 km/h	↖ 10 km/h	↗ 10 km/h	↘ 15 km/h

(Source : Météo France, Tavaux, 02/07/2026 à 9h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.






MAÏS

RESEAU 2025 - 2026


Stade

Des semis précoces en 2026, associés à des conditions chaudes en mai et en juin, ont conduit à des stades de développement avancés des cultures pour la saison. Les premières floraisons femelles sont observées cette semaine pour les semis de début avril.

Le réseau d'observation est constitué de 50 parcelles.



Localisation des parcelles observées du 29 et 30 juin 2026



Les conditions sèches et caniculaires du 16 au 28 juin se sont achevées par des pluies très variables : de 0 à près de 40 mm, mais le plus souvent peu significatives.

Des conditions chaudes et sèches sont encore annoncées pour au moins une dizaine de jour.

Le déficit hydrique en situations non irriguées est particulièrement précoce et fort dans la grande majorité des situations et beaucoup de parcelles sont fortement marqué par le manque d'eau.



Le déficit hydrique pénalise les maïs – Fontaines (71)

CA71

Ravageurs


Pucerons : pas de risque

Pratiquement plus aucuns pucerons ne sont observés.

Cette année, les comptages de pucerons (Metopolophium

Dirhodum, Sitobion avenae et Rhopalosiphum padi) sur la tour de piégeage d'Auxerre sont restés toujours beaucoup plus faibles que les autres années.

De très nombreux auxiliaires peuvent toujours être observés.

**Rappel de la nuisibilité des pucerons sur le maïs (variable selon les espèces)**

ESPECES	PERIODE DE SENSIBILITE	SEUIL INDICATIF DE NUISIBILITE
Metopolophium dirhodum	3 à 10 feuilles.	5 pucerons / plante avant 3-4 feuilles. 10 pucerons / plante entre 4 et 6 feuilles. 20 à 50 pucerons / plante entre 6 et 8 feuilles. 100 pucerons/ plante après 8-10 feuilles.
Sitobion avenae	3 à 10 feuilles. Début juillet/début août	500 pucerons / plante (avec de nombreux ailés) Intervenir avant la sortie des soies s'il y a présence de miellat sur les feuilles au-dessus du futur épi
Rhopalosiphum padi	Début juillet / début août	- Si quelques panicules colonisées : suivre l'évolution - Si développement population, si absence d'auxiliaires, traiter si 5% des panicules portent des colonies

METOPOLOPHIUM DIRHODUM
(PUCERONS VERTS)

Taille : environ 2 mm.
Couleur : Vert pâle
avec ligne vert foncé sur
le dos.
Cornicules et antennes
claires.

SITOBION AVENAE

Taille : environ 2 mm.
Couleur : variable (vert
foncé, brun ou rose
jaunâtre).
Cornicules et antennes
noires.


RHOPALOSIPHUM PADI

Taille : environ 2 mm.
Forme : globuleuse.
Couleur : Vert très
foncé, presque noir avec
une zone rougeâtre
foncée à l'arrière de
l'abdomen.

Pyràle

L'année 2026 est à ce jour l'année la plus chaude enregistrée.

En somme de températures base 10, l'année est en avance de 17 jours par rapport à la moyenne (2000-2025).
Le cumul de 762 °C a été atteint le 30 juin à Tavaux (39).



L'indicateur des sommes de température est peu précis et parfois insuffisant, il doit être complété par l'observation des adultes.

Les pièges à phéromones (pour piéger les papillons adultes) ont été observés cette semaine sur 31 sites.

Commune	Département	Nombre de pyrales adultes piégées en 2026						
		18 mai	26 mai	1 ^{er} juin	8 juin	15 juin	22 juin	29 juin
CORPEAU	Côte d'or	0	0	0	3	13	1	0
ARGILLY	Côte d'or	0	2	1	5	3	3	0
RUFFEY-LÈS-BEAUNE	Côte d'or	0	2	9	21	30	18	4
LABRUYÈRE	Côte d'or			0	0	0	0	0
POULIGNEY-LUSANS	Doubs				0		0	0
OLLANS	Doubs				0	0	0	0
ASNANS-BEAUVOISIN	Jura	0	0	13	38	36	33	4
BRAINANS	Jura	0	0	0	1	1	1	6
SANTANS	Jura	0	1	7	9	17	11	9
VINCENT-FROIDEVILLE	Jura	0	0	0	0	1	2	5
RANCHOT	Jura	0	2	2	9	14	12	4
VAL-SONNETTE	Jura	1	0	17	21	15	14	1
SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN	Nièvre		23	3	7	11	10	0
VARENNES-LÈS-NARCY	Nièvre			0	7	8	1	3
MAGNY-COURS	Nièvre					1	2	0
PREMERY	Nièvre			1	0	3	0	4
LIMANTON	Nièvre			15	11	14	0	0
BUXY	Saône-et-Loire	0	0	0	0	6	0	0
SANCÉ	Saône-et-Loire		0	0	0	11	0	2
UCHIZY	Saône-et-Loire		0	0	0	8	5	2
UCHIZY	Saône-et-Loire		0	1	0		1	1
BAUDRIERES	Saône-et-Loire		2		0			
CRISSEY	Saône-et-Loire		5		6	2		3
SIMARD	Saône-et-Loire				0	0		0
SIMARD	Saône-et-Loire				0	0		0
L'ABERGEMENT-STE-COLOMBE	Saône-et-Loire		0	0	0	0	0	0
VINCELLES	Saône-et-Loire		0	11	9	8	7	7
COLOMBINE	Haute-Saône		1	0	1	5	0	0
CUGNEY	Haute-Saône		1	1	2	5	0	0
CHEVIGNEY	Haute-Saône			0	0	2	0	0
MONT-SAINT-SULPICE	Yonne		1		0			1
DRACY	Yonne		0	0		0		0
FOUCHERES	Yonne		14	8	25	26		26
PERCEY	Yonne		2	0	0			1
APOIGNY	Yonne					1		0
SOUMAINTRAIN	Yonne		0	0	2	0	2	
Moyenne		0,1	2,2	3,3	5,4	7,8	4,6	2,4

Les piégeages sont de moins en moins généralisés : 50 % des parcelles observées avec des captures contre 59 % la semaine dernière et 86 % il y a quinze jours.

Le nombre d'individus piégé est également en baisse depuis 15 jours.

Avec les fortes températures observées, il n'y a pas de grandes différences de précocité entre les différents secteurs de production du maïs grain de la région.

Aucunes nouvelles pontes ne sont observées.


Pour les parcelles qui ne sont pas protégées par les trichogrammes, les autres moyens de lutte ne sont efficaces que sur les jeunes chenilles qui se baladent sur le feuillage avant de pénétrer dans la plante.

Le maximum de larves à ce stade coïncide généralement avec le pic de vol des adultes observés.

Le piégeage d'adulte est en forte baisse. Le pic de vol est clairement dépassé.

- **Parcelles avec moins de 10 % de plantes avec présence de perforations sur feuilles**


Le risque de dégâts est faible.



- **Parcelles avec plus de 10 % de plantes avec présence de perforations sur feuilles**

Le pic de vol des adultes a été atteint il y a une dizaine de jours.

Le stade d'évaluation du risque est dépassé. Toute lutte est maintenant inefficace.



Les conditions encore chaudes toujours accompagnées de faibles hygrométries dans les jours à venir ne sont pas favorables au taux de réussites des dernières pontes et au risque pyrale.



Perforations et traces de sciure et larve de baladeuse de pyrale

FREDON BFC et CA71

Le réseau de piégeage de la chrysomèle du maïs a commencé à se mettre en place la semaine dernière sur des parcelles en monoculture de maïs.

Des piégeages ont déjà été observés avec un nombre important d'individus sur la quasi-totalité des sites de la Côte d'or, du Jura et de Saône-et-Loire.

Habituellement les premières captures sont réalisées la deuxième quinzaine de juillet.

Comme en 2022, 2023 et 2025, une présence importante est notée dès fin juin-début juillet.

Les populations sont en cours d'installation. Il n'y a pas de risque à court terme. Pour éviter cette progression, il est recommandé de couper la monoculture, une année sur 4.

Aucun moyen de lutte n'est efficace à ce stade, seule la rotation des cultures assure un contrôle de la progression de la chrysomèle.



Chrysomèle du maïs (adulte)
CA71



Piège à Chrysomèle du maïs (adulte)
CA71

Nombre de chrysomèles piégées

Commune	Département	29 juin 2026	
		Piège à phéromones	Piège chromatique
CORPEAU	Côte d'or	75	
ASNANS-BEAUVOISIN	Jura	29	
ARLAY	Jura	8	
BIARNE	Jura	5	
BLETTERANS	Jura	13	
BRAINANS	Jura	11	
GEVRY	Jura	0	
ORCHAMPS	Jura	14	
RANCHOT	Jura	70	0
RANS	Jura	13	
ROCHEFORT-SUR-NENON	Jura	63	0
SAINT LOTHAIN	Jura	6	
SANTANS	Jura	271	
SELLIERES	Jura	10	
VAL-SONNETTE	Jura	20	
VAL-SONNETTE	Jura	36	
VINCENT-FROIDEVILLE	Jura	9	
VARENNES-LES-MÂCON	Saône-et-Loire		7
SANCE	Saône-et-Loire	146	
FLEURVILLE	Saône-et-Loire	3	
SENOZAN	Saône-et-Loire	14	

ADVENTICES

- Mieux connaître les mauvaises herbes pour mieux les gérer
Rendez-vous sur le site INFLOWEB : <http://www.infloweb.fr/>

LIENS UTILES

- Pour plus d'information sur les résistances aux PPP : [R4P \(r4p.inra.fr\)](http://r4p.inra.fr)
- Baromètre des maladies du blé tendre : <http://www.barometre-maladies.arvalis-infos.fr/bletendre/>
- *Note commune 2026* – INRA, ANSES, ARVALIS – Institut du Végétal pour la gestion de la résistance aux fongicides utilisés pour lutter contre les maladies des céréales à paille <https://www.arvalis.fr/infos-techniques/telechargez-la-note-commune-inrae-anses-arvalis>
- Plantes exotiques envahissantes : <http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/>
- Organismes nuisibles réglementés : https://www.eppo.int/ACTIVITIES/quarantine_activities
- Biocontrôle : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>
- Note auxiliaires et pollinisateurs : [Réglementations et recommandations - Agriconnaissances.fr](http://reglementations-et-recommandations-agriconnaissances.fr)

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédaction animée par ARVALIS-Institut du Végétal, Terres Inovia et les Chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté.



Bulletin édité à partir des observations réalisées par :



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.