CHAMBRES D'AGRICULTURE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

CASSIS

N°2 du 10/04/2025

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL

de Bourgogne-Franche-Comté

A RETENIR

- Stade : Boutons floraux libres à 1ère fleur en NB. 1ère fleur à 50% de floraison en BD et RN
- Ravageurs : Premières chenilles observées : présence faible pour le moment.
  Premiers pucerons verts et cendrés observés en secteur sud.
- Maladies : Spores d'anthracnose matures, première contamination prévue sur la prochaine pluie.
- Auxiliaires : Pollinisateurs domestiques et sauvages sont présents sur les parcelles. Les coccinelles ont aussi commencé leur rôle de régulation des pucerons.

Météo

Les températures moyennes se sont maintenues sur les 2 dernières semaines avec des journées chaudes et ensoleillées accompagnées de températures nocturnes fraiches approchant les 0°C certaines nuits. Ces conditions ont ralenti l'entrée en floraison des cassissiers qui, contrairement aux années 2023 et 2024, ont eu un stade « boutons floraux libres » marqué.

Météo 7 jours	Merceuil	Bonnencontre	Concoeur	Chaume
T moy Min – Max	12,5°C 0,5 – 24,4	11,6 °C 0,6 – 24,0	13,3 °C 3,2 – 24,1	11,0 °C -0,1 – 23,4
Pluvio	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm

Températures et pluviométrie des 7 derniers jours, données SENCROP, extraction au 09/04/2025

Les températures diurnes devraient se maintenir et les températures nocturnes remontent à partir d'aujourd'hui. Des pluies significatives et régulières sont aussi prévues à partir de samedi / dimanche.

	jeu. 10	ven. 11	sam. 12	dim. 13	lun. 14	mar. 15	mer. 16
	0	0	0	11.3	21.7	28.4	26.3
%	29 / 61	32 / 71	29 / 82	58 / 89	73 / 100	51 / 100	68 / 94
	8 / 20	7 / 22	7 / 22	11 / 20	12 / 17	10 / 18	10 / 16

Prévisions météorologiques sur 7 jours pour Merceuil, données METEOBLUE, extraction le 10/04/2025

Ces notes visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétale.

Stades

Au niveau des Noirs de Bourgogne, les secteurs précoces et les secteurs tardifs ont atteints un stade de développement similaire : « boutons libres » à « 1ère fleur ouverte » (secteurs qui ont habituellement 7 à 10 jours de décalage) expliqué par des températures similaires entre les secteurs. Les Blackdown et Royal de Naples sont pour leur part aux stades « 1ère fleur ouverte » à « 50% des fleurs ouvertes ».



Ravageurs

Chenilles

Des chenilles ont été observées sur une grande partie des parcelles du réseau mais avec une fréquence très faible et peu de dégâts observés : en moyenne 1 à 2 rameaux touchés avec moins de 5 fleurs prédatées pour 50 observations, toute variétés confondues. Quelques parcelles de l'est du réseau ont une présence allant jusqu'à 10% des rameaux touchés.
Pour le moment, la pression est beaucoup faible qu'en 2024 et les chenilles observées sont peu voraces. Leur activité pourrait reprendre avec la montée des températures matinales.

Préconisations :
Des observations régulières de vos parcelles vous permettra de déterminer leur niveau de pression et les moyens de lutte adaptés.

Plus d'informations :

- Fiche de reconnaissance « Chenille » de la Chambre d' Agriculture de Côte-d'Or
- Des essais de piégeages massifs et de confusion sexuelle par phéromones sont actuellement testés ! Plus d'informations très bientôt dans le cadre du Projet Evol'Cassis!

Chenilles et dégâts liés à leur présence, avril à mai 2024

Méthodes alternatives, des produits de biocontrôle existent :
Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : liste des produits de biocontrôle

Pucerons

Les premiers pucerons verts ont été observés dans quelques parcelles du secteur sud (Tichey et Bonnencontre avec une fréquence de 5%). Quelques colonies de pucerons cendrées ont aussi été observées mais avec une fréquence et des dégâts très faibles pour le moment.
Des coccinelles ont aussi été observées sur différentes parcelles du réseau. Tant que la pression des pucerons reste faible à modérée (fréquence inférieure à 20%), les auxiliaires devraient pouvoir gérer les populations de pucerons.

Préconisation : Tant que moins de 20% des rameaux sont touchés, aucune intervention n'est justifiée .

.

De gauche à droite : Puceron jaune et puceron vert sur feuille, pucerons cendrés sur extrémité de rameaux

Méthodes alternatives, des produits de biocontrôle existent :
Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : liste des produits de biocontrôle

Maladie

Anthracnose

Les spores d'anthracnose ont atteint leur maturité au 04 avril mais aucune projection n'a encore été observée au vu du manque de pluies. Les pluies prévues sur la fin de semaine (>10 mm) vont provoquer les premières contaminations à partir des spores contenues dans les feuilles mortes présentes au sol. En cas de contamination, les premiers symptômes devraient donc apparaître dans les 15 prochains jours.
Préconisations : Au vu de la forte pression anthracnose de 2024, les foyers de contamination risquent d'être nombreux dans les parcelles. Une anticipation des pluies significatives (supérieures à 10 mm) sera la clé d'une protection raisonnée et efficace.

à Un suivi de la maturité des spores et des contaminations primaires est réalisé chaque année par la FREDON BFC pour la filière cassis.

Plus d'informations :
Fiche de reconnaissance « Anthracnose » de la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or

Feuille morte source de contamination et premiers symptômes de contamination

Méthodes alternatives, des produits de biocontrôle existent :
Les produits de biocontrôle sont listés dans la Note de service DGAL/SDSPV consultable en cliquant sur ce lien : liste des produits de biocontrôle

Des variétés sont aussi plus sensibles que d'autres à l'anthracnose : favoriser l'Andega (variété résistante) par rapport au Blackdown (variété sensible) contribue à diminuer le nombre de traitements nécessaires à la gestion de la maladie.

Auxiliaires

Les premiers auxiliaires ont été observés sur les parcelles : coccinelles et pollinisateurs sont de sortie.
Pour le moment, les abeilles domestiques et les reines bourdons sont les plus facilement observables mais de plus petits pollinisateurs peuvent être observés sur les pissenlits et autres fleurs ayant déjà fleuries.

Coccinelle et fleur de cassis, mars 2025

La biodiversité du sol est importante pour les vergers de cassis. Impactés par vos pratiques culturales, vos traitements phytosanitaires herbicides et insecticides ont un impact sur leurs développements.

Protection des pollinisateurs :
Pollinisateurs et autres auxiliaires sont maintenant bien présents sur les parcelles.
Pour leur protection, un arrêté a été mis en place en 2023 concernant les modalités de traitement lors de la floraison des cultures et de leurs inter-rangs. Pensez à appliquer la réglementation !
Plus d'informations :
Ecophyto sur la protection des pollinisateurs
FAQ sur l'arrêté abeille

Abeille domestique, bourdon et abeille terricole sauvage observés en vergers de cassis, avril 2025

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédigé par la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, avec la collaboration du SRAL et de la FREDON, à partir des observations réalisées par : CA 21 - CA 71 - FREDON BFC.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les viticulteurs et agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.

Action du plan Ecophyto II+ piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'office français de la biodiversité.

Avec la participation financière de

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ