



VOUS LISEZ LE BSV ? VOTRE AVIS COMPTE !

Dans le cadre d'une étude sur le BSV 2.0, le [CST Ecophyto](#), comité indépendant de gouvernance de la stratégie Ecophyto, mène une enquête auprès des lecteurs du BSV pour mieux comprendre leurs usages, la valeur qu'ils lui accordent et leurs attentes. Les résultats alimenteront l'élaboration de recommandations sur le dispositif.

La réponse à ce questionnaire vous demandera environ 15 minutes :

<https://sondages.inrae.fr/index.php/375212?lang=fr>

L'enquête sera ouverte du 26 mai au 26 juin. Les réponses sont anonymes mais si vous souhaitez recevoir une synthèse des résultats et le rapport final, vous pouvez laisser votre adresse e-mail en fin de questionnaire.

Ce retour sera précieux pour cette étude, et l'équipe du CST Ecophyto vous remercie par avance du temps que vous y consacrerez.

	culture	problématique	niveau de risque	présence d'auxiliaires	comparaison N-1
HORTICULTURE	Chrysanthèmes 	thrips			<
		pucerons			<
		acariens	surveillance		>
		punaises			=
		chenilles	surveillance		>
		rouille			=
		virose			=
		cicadelles			=
		verticilliose			=
	Cyclamen 	pucerons			=
		thrips			<
		acariens	surveillance		>
		chenilles	surveillance		>
		sciarides			=
		cicadelles			=
		tarsonèmes			=
		botrytis			=
		fusariose			=
		bactériose			=
	Vivaces 	pucerons		coccinelles, cécidomyies	=
		chenilles			=
		acariens			<
		botrytis			=
		dépérissement/lavandes	surveillance		
		oïdium			<

	culture	problématique	niveau de risque	présence d'auxiliaires	comparaison N-1
PEPINIERE	arbustes en croissance 	oïdium	Perforant		=
		otiorhynques			<
		taches noires			=
		acariens			=
		chenilles			=
		psylles/elaeagnus	adultes		X
		pucerons			=
	Fruitiers 	pucerons			<
		chenilles			=
		rouille	poirier		<
	Rosiers 	pucerons			>
		acariens	ponctuellement		>
		chenilles			=
		taches noires	ponctuellement		=
		oïdium			=

Légendes :

	pas de pression, surveillance de mise	→ risque quasi nul
	quelques foyers localisés	→ risque faible
	populations en extension	→ risque moyen
	forte pression	→ risque fort

Comparaison du risque, par rapport à l'année dernière, à la même période :

- > Pression supérieure
- < Pression moindre
- = Pression identique
- X Pas de données N-1

2 pictogrammes pour retrouver d'un coup d'œil /



les solutions de biocontrôle

 [Liste des produits de biocontrôle](#)

les résistances d'un bioagresseur sur une culture, vis-à-vis d'une matière active

 [Résistance aux produits phytosanitaires](#)

Présentation du réseau BSV Horti-pépi :



Le réseau d'observateurs 2026 est constitué de **25 exploitations** (entreprises de production horticole, pépinière et lycée), pratiquant principalement la **Protection Intégrée** des cultures, et représentatives de la filière, par leur taille et leur circuit de commercialisation.

Météo et risques :

Gamme des températures des prochains jours

T°C	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	Risque
Pucerons											+++
Acariens											+++
Thrips											+++
Maladies fongiques	Fortes chaleurs										-



Prévisions Météo France à retrouver [ICI](#)

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre Régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.





HORTICULTURE

Chrysanthèmes et cyclamens :



Contexte cultural : début de culture || plusieurs espèces || sous abri et extérieur



Repiquage en cours des chrysanthèmes (photos producteurs)



Repiquage en cours des cyclamens (photos producteurs)



Acariens :


Les conditions météorologiques annoncées sont très favorables aux acariens, le risque est donc **moyen**.



Des lâchers inondatifs d'*Amblyseius californicus* peuvent être réalisés pour contenir les acariens tétranyques.

- Action préventive et curative
- Prédate tous les stades du ravageur
- S'installe bien dans les cultures ornementales

+ d'infos :



Chenilles :

Le pic de chaleur est très propice aux pontes de papillons, il est très probable de voir apparaître des chenilles dans les jours à venir, le risque est donc **moyen**.



Une application de produit à base de Bt (*Bacillus thuringiensis*) peut être envisagée, pour limiter la pression chenilles. Le produit doit être appliqué sur le feuillage, pour qu'il soit ingéré par la chenille.

+ d'infos :

Vigne, arboriculture, cultures légumières	Ravageurs	Fiche 94	Gestion des chenilles phytophages en cultures fruitières et maraîchères et en vigne par <i>Bacillus thuringiensis</i>

Vivaces




Contexte cultural : grande diversité || sous abris et extérieur



Pucerons :

Des observations de pucerons sont remontées. Il y a aussi une belle population d'auxiliaires spontanés (coccinelles et cécidomyies prédatrices), qui limitent les foyers.



Gros foyer de pucerons sur vivaces (photos producteur)




Adulte et larve de coccinelle (photos producteur)



PEPINIERE

Arbustes en croissance

🌿 Contexte cultural : nombreuses espèces || sous abri et extérieur || en croissance || hors-sol et pleine terre



Parcelle et tunnel de pépinière (photos AE)



Oïdium :

Des symptômes d'oïdium perforant sont observés sur *Prunus laurocerasus*.



Criblure par oïdium (photo AE)

+ d'infos :





Pucerons :

Des foyers sont observés, surtout sous abris. Des larves de coccinelle *Scymnus* sp. sont présentes spontanément.



Gros foyer sur hibiscus, larve de *Scymnus* (photos AE)

Fruitiers

Contexte cultural : Nombreuses espèces || hors-sol



Rouille :

On observe les premiers symptômes de la rouille grillagée du poirier.



Première tache orange (photo AE)

Rosiers

Contexte cultural : Nombreuses espèces || hors-sol || sous abri et extérieur



Tunnel de rosiers (photo AE)



Pucerons :

Des foyers de pucerons sont observés. Ils ne sont pas très étendus et il y a des auxiliaires spontanés (syrphes) bien présents, ce qui devrait éviter la pullulation, le risque reste **faible**.



Pucerons sur boutons floraux et adulte de syrphe (photos AE)



Acariens :

Sous abri, sur une seule variété, on observe des acariens. La pression est assez forte, car l'on peut déjà voir des toiles. Les conditions météo leur étant favorable, il faut être vigilant.



Acariens stade toile (photos AE)



Taches noires :

Des symptômes de taches noires sont remontés. La maladie n'est pas encore généralisée et les conditions météo annoncées vont lui être défavorables (humidité nécessaire)... sauf en cas d'irrigation par aspersion !



Taches noires sur rosier (photo AE)

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédigé par Johanna COURAUDON – ASTREDOR EST, avec la collaboration de la FREDON Bourgogne-Franche-Comté, à partir des observations réalisées dans les entreprises bourguignonnes et franc-comtoises.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et les pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.

