

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
de Bourgogne-Franche-Comté

	culture	problématique	niveau de risque	présence d'auxiliaires	comparaison N-1
HORTICULTURE	cyclamen	pucerons			=
		thrips			<
		acariens			=
		chenilles			=
		sciarides			=
		cicadelles			=
		tarsonèmes			=
		botrytis			=
		fusariose			=
		bactériose			=
	poinsettia	aleurodes			=
		acariens			=
		botrytis			=
		fusariose			=
		rhizoctonia			=
		cochenilles			=
	pensées	pucerons			=
		sciarides			=
		chenilles			=
		botrytis			=
		acariens			=
		oïdium			<
		tâches			=
		mildiou	A SURVEILLER		=
		dépérissement			=
		rouille			=

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

	culture	problématique	niveau de risque	présence d'auxiliaires	comparaison N-1
HORTI	primevères	pucerons			=
		chenilles			<
		sciarides			=
		mildiou	A SURVEILLER		=
		ramularia			=
		dépérissement			=
		botrytis			<

Légendes :

pas de pression, surveillance de mise	→ risque quasi nul
quelques foyers localisés	→ risque faible
populations en extension	→risque moyen
forte pression	→ risque fort

Comparaison du risque, par rapport à l'année dernière, à la même période :

> Pression supérieure
< Pression moindre
= Pression identique
X Pas de données N-1

2 pictogrammes pour retrouver d'un coup d'œil :

les solutions de biocontrôle 👉 Liste des produits de biocontrôle

les résistances d'un bioagresseur sur une culture, vis-à-vis d'une matière active
👉 Résistance aux produits phytosanitaires

Présentation du réseau BSV Horti-pépi :



Le réseau d'observateurs 2026 est constitué de 25 exploitations (entreprises de production horticole, pépinière et lycée), pratiquant principalement la Protection Intégrée des cultures, et représentatives de la filière, par leur taille et leur circuit de commercialisation.

Météo et risques :

T°C	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	Risque
Pucerons											+
Acariens											+
Thrips											+

Gamme des températures des prochains jours

Prévisions Météo France à retrouver ICI

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre Régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.














HORTICULTURE


Cyclamen

Contexte cultural : culture en cours (floraison) || sous serre

Thrips :

Les températures se rafraichissent (+ baisse des consignes !) et les lâchers d'acariens prédateurs commencent à montrer leur limite dans la gestion des thrips. Plusieurs observateurs font remonter la présence de quelques individus, provoquant notamment des dégâts dans les fleurs.







Thrips adultes sur fleurs (photos producteur)

Botrytis :

Une observation est remontée quant à la présence de botrytis dans les cyclamens. Cette maladie peut provoquer d'importantes pertes de végétaux quand elle s'installe… et est surtout compliquée à réguler.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto



La prophylaxie est votre meilleure alliée !

- Bien ventiler les serres (renouvellement + circulation)
- Distancer les pots
- Gérer l'arrosage
- Choisir un terreau drainant
- Nettoyer / effleurer régulièrement
- Possibilité d'appliquer des produits de biocontrôle en préventif

Poinsettia

Contexte cultural : culture en cours (coloration des bractées) || sous serre chaude



Culture en cours de poinsettia (photo Producteur)

Aleurodes :

Quelques foyers sont repérés, encore assez faibles, mais qui doivent être maitrisés rapidement pour ne pas se faire dépasser.

B

L'auxiliaire *Encarsia formosa* couramment lâché pour gérer les aleurodes voit son **activité réduire en jour court** (jusqu'à 2 fois moins d'aleurodes parasitées !). Il faut donc changer d'auxiliaire si votre stratégie est basée uniquement sur des parasitoïdes.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

Pensées

Contexte cultural : début de culture || *Viola* et *Cornuta* || pensées d'automne || sous abri

Mildiou :

Les journées sont fraiches mais ensoleillées et les températures sous serre/abris peuvent monter en journée. Ainsi les conditions sont réunies pour favoriser le mildiou (fort écart de température entre la nuit et le jour).

Primevères

Contexte cultural : culture en cours || sous abri

Chenilles :

Un observateur fait remonter la présence de quelques chenilles défoliatrices.



Dégâts de chenilles défoliatrices (*photo* AE)

B

Une application d'un produit à base de Bt (*Bacillus thuringiensis*) peut être envisagé en présence de chenilles de lépidoptères « actives », sauf si la température est trop fraiche (< **12°C**).

Mildiou :

Comme évoqué précédemment, les conditions météo sont favorables au développement de cette maladie.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto



Bonne Toussaint !

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédigé par Johanna COURAUDON – ASTREDOR EST, avec la collaboration de la FREDON Bourgogne-Franche-Comté, à partir des observations réalisées dans les entreprises bourguignonnes et franc-comtoises.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et les pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.