


# BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL
## de Bourgogne-Franche-Comté

| | culture | problématique | niveau de risque | présence d'auxiliaires | comparaison N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HORTICULTURE | Pensées | pucerons | | | > |
| | | sciarides | | | = |
| | | chenilles | | | = |
| | | botrytis | | | = |
| | | acariens | | | = |
| | | oïdium | à surveiller | | = |
| | | tâches | | | = |
| | | mildiou | à surveiller | | = |
| | | dépérissement | | | = |
| | | rouille | | | = |
| | Primevères | pucerons | | | > |
| | | chenilles | | | > |
| | | sciarides | | | = |
| | | mildiou | | | = |
| | | ramularia | | | = |
| | | dépérissement | | | = |
| | | botrytis | | | < |
| | Poinsettia | aleurodes | | | = |
| | | acariens | | | = |
| | | botrytis | | | > |
| | | fusariose | | | = |
| | | rhizoctonia | | | = |
| | | cochenilles | | | = |
| | Cyclamen | pucerons | | | < |
| | | thrips | | | > |
| | | acariens | | | = |
| | | chenilles | *Duponchelia* | | > |
| | | sciarides | | | = |
| | | cicadelles | | | = |
| | | tarsonèmes | | | = |
| | | botrytis | | | = |
| | | fusariose | | | = |
| | | bactériose | | | = |

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

**Légendes :**

| | |
|---|---|
| pas de pression, surveillance de mise | → risque quasi nul |
| quelques foyers localisés | → risque faible |
| populations en extension | →risque moyen |
| forte pression | → risque fort |

Comparaison du risque, par rapport à l'année dernière, à la même période :

> Pression supérieure
< Pression moindre
= Pression identique
X Pas de données N-1

2 pictogrammes pour retrouver d'un coup d'œil :




les solutions de biocontrôle 👉 Liste des produits de biocontrôle

les résistances d'un bioagresseur sur une culture, vis-à-vis d'une matière active
👉 Résistance aux produits phytosanitaires

## Présentation du réseau BSV Horti-pépi :



Le réseau d'observateurs 2026 est constitué de 25 exploitations (entreprises de production horticole, pépinière et lycée), pratiquant principalement la Protection Intégrée des cultures, et représentatives de la filière, par leur taille et leur circuit de commercialisation.

## Météo et risques :

*Gamme des températures des prochains jours*

| T°C | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pucerons | | | | | | | | | | | + |
| Acariens | | | | | | | | | | | + |
| Thrips | | | | | | | | | | | + |

Prévisions Météo France à retrouver ICI

## Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre Régionale de Bourgogne Franche-Comté.

### Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.





























# HORTICULTURE

## Pensées

Contexte cultural : culture en cours || *Viola* et *Cornuta* || pensées de printemps || sous abri froid

### Pucerons :

Observation de quelques foyers de pucerons sous les feuilles.

B

La lutte biologique est impossible, puisque les conditions de températures ne sont pas remplies.

Il faut alors se tourner vers des **produits de biocontrôle**, pour laquelle la **qualité de pulvérisation** est un facteur majeur d'efficacité.

### Botrytis :

Les conditions climatiques sont favorables à cette maladie, quelques pots sont touchés !

### Oïdium :

Les conditions climatiques sont également favorables au développement de cette maladie… qui reste compliquée à contenir : il est primordial d'intervenir dès les premières tâches observées !



*Oïdium sur pensées (photos AE)*



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

## Primevères

Contexte cultural : culture en cours || sous abri



*Culture primevères en cours (photo AE)*

### Pucerons :

Tout comme sur les pensées, les premiers foyers de pucerons sont observés…

### Chenilles :

Un observateur fait remonter la présence de quelques chenilles défoliatrices, avec des dégâts localement importants (quelques pots très touchés).



*Dégâts et présence de chenille sur primevères (photo AE)*



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

## Poinsettia

Contexte cultural : culture en cours (bractées colorées) || sous serre chaude



*Culture en cours de poinsettia (photos Producteur)*

### Botrytis :

Sous serre chaude aussi, du botrytis s'installe et peut provoquer d'important dégâts localement. Le champignon commence par un bord de feuille ou au pied de la plante (souvent lorsqu'une feuille touche le substrat), puis progresse jusqu'à contaminer toutes les tiges (le poinsettia jaunit et fane) et faire mourir la plante.



*Botrytis sur tige (photos AE)*

## Cyclamen

Contexte cultural : stade vente || sous serre




*Culture de cyclamen (photo AE et Producteur)*

### Thrips :

Des individus sont observés dans les fleurs des cyclamens (surtout mini), avec présence de quelques dégâts quand même.

B

L'effleurage des fleurs piquées reste une bonne solution, en complément de la lutte biologique.

### Chenilles :

Des larves de *Duponchelia fovealis* sont observées dans les pots.

### Botrytis :

Une observation est remontée quant à la présence de botrytis dans les cyclamens. Cette maladie peut provoquer d'importantes pertes de végétaux quand elle s'installe et atteint le cœur de la plante… et est surtout compliquée à réguler.

Bonnes pratiques



**La prophylaxie est votre meilleure alliée !**

- Bien ventiler les serres (renouvellement + circulation)
- Distancer les pots
- Gérer l'arrosage
- Choisir un terreau drainant
- Nettoyer / effleurer régulièrement
- Possibilité d'appliquer des produits de biocontrôle en préventif
- Evacuer les pots les plus touchés au fur et à mesure



Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

# Dernier BSV de la saison !

Un grand **merci aux observateurs** pour leur implication, on se retrouve l'**année prochaine** !




Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté et rédigé par Johanna COURAUDON – ASTREDOR EST, avec la collaboration de la FREDON Bourgogne-Franche-Comté, à partir des observations réalisées dans les entreprises bourguignonnes et franc-comtoises.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les horticulteurs et les pépiniéristes pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.