

BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL de Bourgogne-Franche-Comté

Liste de diffusion : inscrivez-vous en ligne !

Si vous ne recevez pas encore le BSV Légumes chaque semaine, vous pouvez vous abonner en cliquant [ici](#)

PREVISIONS METEO

Besançon (25)

MERCREDI 01



18° / 28°

▲ 20 km/h

JEUDI 02



14° / 28°

▲ 10 km/h

VENDREDI 03



16° / 27°

▼ 15 km/h

SAMEDI 04



14° / 30°

► 10 km/h

DIMANCHE 05



15° / 32°

▼ 10 km/h

LUNDI 06



17° / 32°

▼ 10 km/h

Dijon (21)

MERCREDI 01



18° / 29°

▲ 20 km/h

40 km/h

JEUDI 02



15° / 30°

▲ 15 km/h

VENDREDI 03



16° / 29°

► 20 km/h

SAMEDI 04



15° / 32°

► 10 km/h

DIMANCHE 05



17° / 33°

▼ 15 km/h

LUNDI 06



19° / 34°

► 10 km/h

Nevers (58)

MERCREDI 01



15° / 28°

▲ 20 km/h

40 km/h

JEUDI 02



13° / 30°

▲ 15 km/h

VENDREDI 03



14° / 29°

▼ 15 km/h

SAMEDI 04



14° / 33°

▼ 15 km/h

DIMANCHE 05



16° / 34°

▼ 15 km/h

LUNDI 06




18° / 35°

▼ 10 km/h

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Toutes les fiches biodiversité et santé des agrosystèmes ainsi que les fiches réglementaires sont disponibles sur le site de la Chambre régionale de Bourgogne-Franche-Comté.



2 pictogrammes pour retrouver d'un coup d'œil :



Les solutions de biocontrôle

 [Liste des produits de biocontrôle](#)

Les résistances d'un bioagresseur sur une culture, vis-à-vis d'une matière active.

 [Résistance aux produits phytosanitaires](#)



POMME DE TERRE

Stade phénologique

Départements	13 parcelles observées sur les 17 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Fénay, St Julien, Varanges, Quetigny, Noiron sous Gevrey, Chevigny-Saint Sauveur	1 parcelle en fermeture de rang 12 parcelles en cours de tubérisation
Doubs		
Haute-Saône	Montagney	
Jura	Augisey, Larnaud	
Nièvre	Parigny-les-Vaux, Pougny, Nevers	
Yonne	Orgy	



Variété Marabel, Corcelles les Citeaux (21), 30/06/26 (AL Galimard)

Maladies

Mildiou



Observations

Aucun symptôme observé cette semaine sur l'ensemble du réseau.

Suite à un souci technique, le tableau Mileos ne peut figurer pour l'édition de ce BSV.



Evolution du risque

Vu la météo annoncée, le risque est faible même si l'irrigation est en place sur les parcelles.


Alternaria



Observations

8 parcelles du réseau présentent des symptômes foliaires, 4 parcelles avec quelques taches, 3 avec quelques plantes atteintes et 1 parcelle détruite à plus de 50 %.

Attention, la combinaison : chaleur actuelle + stress hydrique peut augmenter le risque pour cette maladie de faiblesse, surtout sur les parcelles non irriguées.



Symptômes d'*Alternaria concentriques*, variété *Anabelle*, Chevigny St Sauveur (21), 29/06/26 (AL Galimard)

Ravageurs

Doryphore



Observations

9 parcelles touchées sur les 13 du réseau. Dans la plupart des situations, cela va de quelques adultes à plus de 25 % de la parcelle détruite.



Seuils de nuisibilité

- en agriculture conventionnelle : présence en bordure de 2 foyers pour 1 000 m² (foyer : 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves **au stade grain de blé**).
- en agriculture biologique : présence en bordure de 2 foyers pour 1 000 m² (foyer : 1 ou 2 plantes avec au moins 20 larves **au stade éclosion**).

Le risque est élevé.

Puceron



Observations

1 seule parcelle avec uniquement quelques adultes observés sur 20% des plantes.

L'auxiliaire présent sur la majorité des parcelles reste les coccinelles adultes et/ou larves et plus ponctuellement, les syrphes, quelques chrysopes sur une parcelle.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Pomme de Terre
Mildiou	À surveiller
Alternaria	
Doryphore	
Puceron	

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



OIGNON

Stade phénologique

Départements	3 parcelles semées observées sur 3	9 parcelles bulbilles observées sur 9	2 parcelles en mottes observées sur 2
Côte-d'Or	Fénay, Domois, Arc-sur-Tille	Arc-sur-Tille, Quetigny, Fauverney	
Haute-Saône			Montagney
Nièvre		Parigny-les-Vaux, Pougny, Nevers	
Jura		Champdivers, St Aubin	St Lomain
Yonne		Orgy	
Stade(s) majoritaire(s)	6 ^{ème} feuille à début bulbaison	Début bulbaison à 70 % de la taille finale	7 ^{ème} feuille à bulbaison

La chaleur extrême de la semaine dernière ainsi que les orages ont occasionné des dégâts dans certaines parcelles, comme le montre la photo ci-dessous.



Oignons bulbilles, Pougny (58), 30/06/26 (J Nagopaé)

Maladies

Mildiou



Observations

Aucun symptôme de mildiou cette semaine.



Evolution du risque

Le risque est faible au vu de la météo annoncée. La vigilance reste de mise dans les parcelles précédemment contaminées.

Brûlure des feuilles (*Botrytis squamosa*)



Observations

Maladie absente du réseau cette semaine.

Risque nul.

Ravageurs

Thrips



Observations

10 parcelles sur les 14 montrent la présence du ravageur, avec quelques individus visibles sur plus de + 50 % des plantes.



Dégâts de Thrips, Arc /Tille (21), 26/06/26 (L. Thibault)



Biocontrôle

L'irrigation peut aider à noyer les individus dans les cornets.

Le thrips auxiliaire *Aeolothrips* est également présent sur 6 des 14 parcelles. Il aide efficacement à réguler les populations du thrips ravageur.

Mouche



Observations

Aucun symptôme observé.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Oignon
Mildiou	À surveiller
Botrytis	
Thrips	
Mouche	

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



AUBERGINE SOUS ABRI

Stade phénologique

Départements	13 parcelles observées sur les 16 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Quetigny, Echenon, Labergement-lès-Auxonne, Messigny et Vantoux, Chevigny St Sauveur	2 parcelles avec des fruits qui ont atteints leur forme typique 11 parcelles au stade récolte
Haute-Saône	Montagney	
Nièvre	Alligny-Cosne, Pougny, Nevers	
Jura	Foucherans, St Lamain, Nance	
Yonne	Orgy	

Ravageurs

Acarien tétranyque



Observations

8 parcelles sont touchées par les acariens tétranyques sur les 13 observées.

- Pour 2 parcelles, l'attaque généralisée à l'ensemble des plants avec présence de toiles
- Pour les 6 autres, la population d'acariens est faible et localisé sur 10 à 50 % des plants

Les acariens tétranyques sont favorisés par les fortes températures, les fortes luminosités et les faibles hygrométries.



Symptômes de piqûres d'acarien sur feuilles, Echinon (21), 26/06/2026 (L.Thibaut)



Prophylaxie

Le blanchiment des tunnels ou la pose de filets d'ombrage, permettent de maîtriser le climat sous abris. Associés à des bassinages, cela permet de maintenir des conditions défavorables aux acariens.



Biocontrôle

Des lâchers précoces d'auxiliaires, notamment des acariens prédateurs comme *Neoseiulus californicus* ou *Phytoseiulus persimilis*, permettent de contenir les populations d'acariens tétranyques. Il faut bien penser à associer les lâchers aux méthodes prophylactiques citées ci-dessus.



Evolution du risque

La pression en acarien risque d'augmenter ces prochains jours, compte-tenu des fortes températures annoncées.

Doryphore



Observations

6 parcelles présentent des doryphores, à une faible pression.
Quelques individus et larves disséminés.



Biocontrôle

Une surveillance et un ramassage réguliers sont indispensables pour éviter que les populations ne se développent trop fortement et deviennent difficiles à réguler. D'autant plus que de nouveaux individus peuvent migrer des pommes de terre primeur des tunnels voisins en cours de récolte.



Evolution du risque

Les conditions restent favorables au développement des doryphores, le risque se maintient à moyen.

Puceron



Observations

6 parcelles sur les 13 présentent des pucerons :

- Pour 5 parcelles, la pression est modérée avec quelques individus ou colonies sur moins de 50% des plants
- Pour 1 parcelle, les plants sont totalement infestés avec plusieurs colonies



Biocontrôle

Les auxiliaires sont présents : coccinelles et momies sur la quasi-totalité des tunnels, des adultes de chrysope et de syrphes, ainsi que des larves d'Aphidoletes observées plus ponctuellement.



Œuf de chrysope, Labergement-Lès-Auxonne (21), 30/06/26 (L. Thibault)



Evolution du risque

Le risque faiblit, au vu des populations d'auxiliaires présentes pour contenir les populations de pucerons.

Punaises phytophages



Observations

Toutes les parcelles sur les 13 présentent des punaises :

- *Lygus* est observable sur la totalité des 13 parcelles, avec des fleurs coupées
- *Nezara* est observé sur 7 parcelles
- *Halyomorpha* sur 1 parcelle



Evolution du risque

Le risque augmente, les punaises apprécient les conditions chaudes.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Aubergine	
Acarien		
Doryphore		
Puceron		
Punaises phytophages		

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



CONCOMBRE SOUS ABRI

Stade phénologique

Cette semaine, 13 parcelles ont été observées sur les 15 tunnels du réseau :

Départements	13 parcelles observées sur les 15 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Quetigny, Echenon, Labergement-lès-Auxonne, Messigny et Vantoux, Chevigny St Sauveur	Tous les tunnels sont au stade récolte
Haute-Saône	Montagney	
Nièvre	Sauvigny-les-Bois, Pougny, Nevers	
Jura	Foucherans, Augisey, St Lamain	
Yonne	Orgy	

Maladies

Oïdium



Observations

3 parcelles présentent quelques taches d'oïdium sur 10% des plantes



Tâches d'oïdium sur concombre, Saint Lamain (39), 26/06/2026 (N. Cadoux)



Prophylaxie

Privilégier des variétés tolérantes à l'oïdium. La proximité des courgettes (mêmes souches), les courants d'air sont également des facteurs favorables au développement et à la dissémination de la maladie.



Evolution du risque

L'oïdium est favorisé par les fortes amplitudes thermiques jour/nuit. Les nuits étant annoncées relativement chaude, le risque reste limité.

Ravageurs

Acarien tétranyque



Observations

9 parcelles sur les 13 observées présentent des acariens, dont :

- 5 parcelles avec des foyers sur 25 % de plantes maximum
- 2 parcelles avec plusieurs colonies sur environ 80 % des plantes
- 2 parcelles avec infestation généralisée et jaunissement des feuilles



Foyer d'acariens et avec présence de toiles, jaunissant une feuille, Labergement-Lès-Auxonne (21), 30/06/26 (L Thibault)



Prophylaxie

Les acariens tétranyques sont favorisés par les fortes températures, les fortes luminosités et les faibles hygrométries.

Le blanchiment des tunnels ou la pose de filets d'ombrage, permettent de maîtriser le climat sous abris. Associés à des bassinages, cela permet de maintenir des conditions défavorables aux acariens.



Biocontrôle

Des lâchers précoces d'auxiliaires, notamment des acariens prédateurs comme *Neoseiulus californicus* ou *Phytoseiulus persimilis*, permettent de contenir les populations d'acariens tétranyques. Il faut bien penser à associer les lâchers aux méthodes prophylactiques citées ci-dessus.



Evolution du risque

La pression en acariens risque d'augmenter fortement ces prochains jours, compte-tenu des fortes températures annoncées.

Puceron



Observations

12 parcelles sur les 13 sont attaquées par les pucerons :

- 3 parcelles présentent quelques colonies et pucerons isolés sur moins 20% des plants
- 4 parcelles présentent plusieurs colonies sur plus de 50% des plants
- 3 parcelles présentent une attaque généralisée



Biocontrôle

Les auxiliaires sont globalement très nombreux : momies d'hyménoptères et coccinelles sur toutes les plantes colonisées et plus ponctuellement Orius, syrphes et Aphidoletes (indigènes ou issus de lâchers) et chrysopes.



Puceron parasité par un acarien prédateur, Saint Lamine (39), 26/06/2026 (N. Cadoux)



Evolution du risque

Le risque augmente, bien surveiller les populations d'auxiliaires pour vérifier que celles-ci peuvent contenir les populations de pucerons.

Thrips



Observations

11 parcelles sur les 13 présentent des thrips

- 6 parcelles avec des populations de thrips faibles et localisées
- 4 parcelles avec quelques individus et fruits piqués sur 40 à 60 % des plants
- 1 parcelle avec de nombreux individus et fruits piqués sur 50 % des plantes



Dégâts de thrips sur le fruit du concombre, Orgy (89), 29/06/26 (C. Doussan)



Evolution du risque

Le risque augmente, d'autant que les parcelles sont globalement au stade récolte et que les thrips peuvent déprécier la qualité des fruits en les déformant.

En résumé

Maladies et ravageurs	Risques sur Concombre	
Oïdium	À surveiller	
Acarien		
Puceron		
Thrips		

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	



TOMATE SOUS ABRI

Stade phénologique

Départements	13 parcelles observées sur les 17 du réseau	Stade(s) majoritaire(s)
Côte-d'Or	Fénay, Quetigny, Echenon, Labergement-lès-Auxonne,	4 parcelles ont leurs fruits qui ont atteints leur taille et forme typique 9 parcelles sont maintenant au stade récolte
Haute-Saone	Montagney	
Nièvre	Sauvigny-les-Bois, Pougny, Nevers	
Yonne	Orgy	
Jura	Foucherans, Augisey, Nance	

Maladies

Mildiou



Observations

Aucune parcelle ne présente de mildiou actif.



Evolution du risque

Les fortes chaleurs sont défavorables au mildiou, les spores étant détruites au-dessus de 30°C.

Le risque est faible.

Cladosporiose



Observations

2 parcelles sur les 13 présentent quelques plants touchés par la maladie.



Evolution du risque

Les températures élevées sont défavorables au développement de la maladie. Le risque est faible.



Prophylaxie

Il existe des variétés tolérantes à la cladosporiose permettant de limiter l'impact de la maladie sur les rendements des cultures.

Ravageurs

Puceron



Observations

7 parcelles sur les 13 présentent des pucerons :

- Pour 4 parcelles, les populations de pucerons sont de faible intensité et localisées
- Pour 3 parcelles, 50 à 90 % plantes présentent de petites colonies.



Mues blanches de pucerons laissées par les individus lors du passage d'un stade larvaire au suivant, Augisey (39), 29/06/2026 (N. Cadoux)



Biocontrôle

Les auxiliaires sont moins nombreux sur tomate que sur les concombres ou les aubergines. Des momies et des punaises prédatrices ont été essentiellement observées, avec ponctuellement des larves d'Aphidoletes et de syrphes.

Aleurode

Aucun aleurode n'a été observé sur les parcelles du réseau.



Observations

Le risque est faible, sauf en cas de proximité avec une culture infestée.

Observation diverse : noctuelles

Dans quelques parcelles localisées dans la Nièvre, la présence de chenilles de noctuelles est visible depuis plusieurs jours. Pour le moment, les chenilles se cantonnent aux feuilles dont elles se nourrissent mais elles peuvent, si les conditions leurs sont favorables, causer plus de dommages sur fruits.

La surveillance de la présence des noctuelles permet d'intervenir à temps pour limiter les dégâts sur fruits.



Dégâts de noctuelles sur feuilles, Sauvigny-les-bois (58), 26/06/26 (J Nagopaé)

En résumé

Maladies et ravageurs	Risque Tomate
Cladosporiose	À surveiller
Mildiou	
Aleurode	
Puceron	

Légende	
Risque nul à faible	
Risque moyen	
Risque élevé	

Biodiversité et santé des agrosystèmes

Ces notes biodiversité visent à accompagner la démarche agroécologique portée par le bulletin de santé du végétal.



Prochain BSV le 16 juillet 2026

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté à partir des observations réalisées par la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or, la Chambre d'agriculture du Jura, la Chambre d'agriculture de la Nièvre et Bio Bourgogne-Franche-Comté.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux-mêmes réalisées sur leurs parcelles ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques de leurs conseillers.

Dispositif supervisé par le Service Régional de l'Alimentation dans le cadre du dispositif de Surveillance Biologique du Territoire du plan régional Ecophyto.