



Myrtille

N°9
22/07/2026



Animateur filière

Magalie LEON
CHLORIS ARBO
cmagalie@hotmail.com

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Myrtille National
N°X du JJ/MM/AA »

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)

Ce qu'il faut retenir

Myrtille

- **Météo** : nouvelle canicule attendue, risques en cours fruits cramés et dépérissements de cannes ou d'arbres.
- **Stades phénologiques** : période de récolte écourtée sur certains vergers ayant subi les fortes chaleurs.
- **Drosophila suzukii** : vol limité avec les températures élevées. Pas de dégâts sur fruits.
- **Maladies sur fruits** : risques faibles.
- **Dépérissements** : accélération des dessèchements des cannes ou des arbres visibles avec les fortes chaleurs.
- **Cochenilles** : début d'essaimage des L1.
- **Cécidomyies** : diminution du vol des adultes en Centre Val de Loire, dégâts visibles sur toutes les parcelles.
- **Campagnols terrestres** : présence.
- **Autres ravageurs** : oiseaux : dégâts très importants !!
- **Auxiliaires** : chrysopes.
- **Mauvaises herbes** : fort développement des adventices !

6 régions participent aux observations de parcelles : Nouvelle-Aquitaine, Sud Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Bourgogne Franche Comté, Auvergne-Rhône-Alpes.



Coup de chaleur sur feuilles.

Côte d'Or (BFC)

20 juillet 2026

(Crédit Photo : AL. Galimard, CA Côte d'Or)



• METEO

(Données météo issues de la Base de données Météo France (meteo.data.gouv.fr))

Pluviométrie cumulée par décades :

Mois	Décade	Fontenoy Le Château (88)	Blois (41)	Auray (56)	Agen (47)	Angoulême (16)	Périgueux (24)	Uzerche (19)	Dax (40)
Total	1er trimestre	328	199	495	257	351	308	440	466
AVRIL	1	3	0	2	0	2	0	16	5
	2	35	3	12	12	20	8	19	18
	3	0	0	2	15	1	1	5	15
MAI	1	19	105	73	55	49	41	80	59
	2	22	20	18	24	26	26	36	32
	3	1	0	1	0	0	0	2	1
JUIN	1	49	15	44	11	8	20	19	18
	2	6	0	1	1	0	0	0	1
	3	11	23	0	27	3	5	4	17
Total	2ème trimestre	145	167	153	144	110	104	182	166
JUILLET	1	0	0	0	1	0	10	5	0
	11 au 19	5	0	6	9	0	8	4	1
TOTAL	Année	478	365	654	412	461	430	631	633

Températures moyennes journalières :

Mois	Décade	Fontenoy Le Château (88)	Blois (41)	Auray (56)	Agen (47)	Angoulême (16)	Périgueux (24)	Uzerche (19)	Dax (40)
Moyenne	1er trimestre	5,2	7,7	9,3	8,7	8,8	8,3	7,3	10,0
AVRIL	1	11,4	13,0	13,8	14,4	15,3	15,4	14,5	15,4
	2	11	11	12	14	13	14	13	15
	3	13	15	16	18	17	17	17	17
MAI	1	14	15	14	16	16	15	14	16
	2	10	11	12	15	13	13	11	15
	3	22	23	23	23	25	24	24	24
JUIN	1	15	16	15	18	17	17	16	18
	2	21	23	19	24	25	24	23	23
	3	28	28	25	29	30	29	29	28
Moyenne	2nd trimestre	16	17	17	19	19	19	18	19
JUILLET	1	23	25	24	26	27	27	26	25
	11 au 19	24	26	25	28	27	27	26	26
MOYENNE	Année	12,0	13,7	14,2	15,2	15,2	14,8	13,9	15,6

Evaluation de la situation


Depuis début juin il n'y a pas eu de pluies significatives. Les orages très localisés ont eu lieu fin juin mais de faibles quantités d'eau ont été relevées. Des orages de grêle ont aussi eu lieu localement causant des dégâts sur les structures des tunnels et les fruits non protégés (Corrèze, Côte d'Or).

Depuis la canicule de fin juin, dans la plupart des régions, les températures maximales ne sont quasiment pas redescendues en dessous de 30°C ! Et par-dessus, le vent a amplifié le dessèchement de l'air.

Les réserves d'eau sont au plus bas, et des mesures de restriction de prélèvements d'eau sont prises dans plusieurs départements.

Ce week-end, des pluies faibles sont annoncées, mais pour la fin de la semaine prochaine, un retour d’une période avec des températures qui dépassent les 40°C est prévu !

Exemple de relevés météo sur Agen



• STADES PHENOLOGIQUES

Situation sur le terrain

Toutes les régions sont toujours en récolte ou en fin de récolte.

Région	Récolte à venir	Début de récolte	Pleine récolte	Fin de récolte	Récolte terminée
Nouvelle Aquitaine		Centrablue Lascall	Osarkblue Aurora Liberty Calypso Aurora	Legacy Blue Ribbon	New Hanover Osorno Clock work
Auvergne Rhône-Alpes	Centrablue		Darrow		
Grand Est			Legacy Brigitta Milieu de récolte pour les variétés récentes.	Bluecrop	
Bourgogne Franche Comté				Toutes variétés du réseau	
Centre Val de Loire				Denise Blue legacy Liberty	Collins Reka Duke Blue One
Bretagne	Sky Blue		Darrow		

Impacts de la canicule :

La canicule de fin juin a eu pour conséquences principales des fruits mous ou brûlés, le blocage du grossissement des myrtilles, le dessèchement des baies (fruits fripés). Les fruits les plus exposés au soleil sont le plus touchés (moins de dégâts à l'intérieur du buisson).

L'intensité des dégâts est faible (dans le Grand Est, la Bretagne, l'Auvergne Rhône-Alpes) à très importants selon les vergers en Nouvelle Aquitaine (Les Landes et la Gironde) et le Centre val de Loire.

Et les températures restées élevées qui ont suivi, contribuent encore à une diminution du calibre dans toutes les régions.



Myrtilles touchées par les coups de soleil et la chaleur : elles n'arrivent pas à maturité.

**Nouvelle Aquitaine
10/07/2026**

(Crédit Photo : M. Léon-Chapoux, Chloris Arbo)

On note un regroupement des récoltes. **La fin des récoltes a été anticipée sur certains vergers** du fait de ce regroupement des maturités et des calibres trop faibles qui nécessitent trop de temps de main d'œuvre pour maintenir un coût de production économiquement viable.

Des dégâts de cannes ou de plants entiers desséchés sont aussi observés, notamment sur les plants les moins bien irrigués en bout de rangs ou quand les goutteurs sont bouchés.



**Dessèchement des
feuilles sur arbres sous
irrigués suite à une
problème d'irrigation.**

**Nouvelle Aquitaine
20/07/2026**

(Crédit Photo : M. Léon-
Chapoux, Chloris Arbo)

Les vergers correctement irrigués sont aussi impactés. Seuls les vergers bien irrigués et protégés par des filets d'ombrage ou équipés d'une aspersion sur frondaison semblent avoir passé le cap des fortes chaleurs sans aucun dégât.

Evaluation du risque

La prochaine canicule attendue la semaine prochaine fait craindre des dégâts sur les variétés tardives telles que Aurora, Lastcall et Centrablue.

• DROSOPHILA SUZUKII


Reconnaissance

[Voir BSV National Myrtille n°7 du 18/06/2026](#)

Situation sur le terrain

Avec les températures élevées depuis début juin, les drosophiles ne sont pas présentes sur les fruits. Aucun dégât observé ces dernières semaines sur l'ensemble des régions du réseau.

Le Ctifl à La Morinière (Centre Val de Loire) a mis en place 2 pièges d'adultes pour suivre le vol des mouches femelles et mâles. Le piégeage est bas et n'évolue pas.



Evaluation du risque

Risque important à partir du moment où les fruits commencent à bleuir. Les températures élevées sont défavorables à la drosophile, le cycle est ralenti.

Méthodes alternatives :

La récolte rapide et totale des fruits mûrs. Augmenter la fréquence des récoltes en cas de présence de drosophiles.

Balayer les fruits mûrs tombés au sol pendant la récolte et les détruire (dans un sac fermé au soleil ou au congélateur).

Entretenir les inter-rangs pour éviter les lieux humides.

Supprimer les eaux stagnantes.

Aérer le buisson par une taille d'hiver plus importante.
Protéger avec des filets anti-drosophiles.
Réaliser du piégeage massif en bordure de parcelles.

• MALADIES SUR FLEURS ET FRUITS

Reconnaissance des maladies

[Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026](#)

Situation sur le terrain

Pas de maladies identifiées sur les fruits.

Evaluation du risque

Risque de contamination faible avec les conditions très sèches annoncées ces prochains jours.

Méthodes alternatives :

A la plantation, éviter les sites humides (planter sur buttes, drainer la parcelle), préférer les sols aérés

Adapter ses pratiques aux variétés : Patriot, Berkeley, Blue One sont sensibles. Bluetta, Aurora sont moins sensibles.

Réaliser une taille importante pour aérer les arbustes


Limitier l'irrigation par aspersion jusqu'à la chute des pétales.

• DEPERISSEMENTS

Situation sur le terrain

Signalement de dessèchements de cannes ou d'arbres un peu dans tous les vergers. Les causes sont multiples selon les situations : manque d'eau, frottements de gibiers, attaques de champignons, campagnols, sésies.

Sur les arbres, des décolorations des tiges et parfois dessèchements sont visibles. Leur fréquence sur le verger est augmentée depuis ce dernier mois de sécheresse intense.



**Dépérissement de cannes
sur Bluecrop
spécifiquement.
Grand Est
20/07/2026**

(Crédit Photo : C. Barbier –
Productrice)



Taches sur rameaux de Blue One.
Centre Val de Loire
24/07/2026
(Crédit Photo : C. Savoure- Productrice)

Evaluation du risque

Avec les conditions sèches et de températures élevées, les dépérissements sont accélérés et bien visibles.

• COCHENILLES (*Parthenolecanium corni*)

Rappel du cycle biologique

[Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026](#)

Situation sur le terrain

Présence importante dans tous les vergers du Sud-Ouest, Centre Val de Loire et Grand Est avec une pression élevée.

Pression moins importante dans les autres régions signalée sur les parcelles du réseau.

Les larves L1 commencent à apparaître sous les feuilles dans toutes les régions.



Larve L1 présentes sur la face inférieure des feuilles.
Vosges (Grand Est)
15/06/2026

(Crédit Photo : C. Barbier, productrice)

Evaluation du risque

Début d'essaimage des larves L1 vers les feuilles et les fruits, stade sensible.

Méthodes alternatives :

Pendant la taille d'hiver il faut supprimer les cannes fortement infestées.


• CECIDOMYIES (*Dasineura oxycoccana*)

Identification

Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026

Situation sur le terrain

Le Ctifl de la Morinière a commencé cette année un suivi du vol de la Cécidomyie sur son verger expérimental : le vol se termine.



Dégâts visibles et significatifs sur les pousses terminales des rameaux poussants sur l'ensemble des parcelles.

Les pousses attaquées sont arrêtées et de nouvelles ramifications sont reparties sous l'attaque.

Evaluation du risque

Fin de vol en cours. Risque faible.

• CAMPAGNOL TERRESTRE

Identification

Voir BSV National Myrtille n°4 du 05/05/2026

Situation sur le terrain

Présence signalée sur les parcelles en Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté avec des dégâts importants sur les jeunes plants.

Evaluation du risque

Risque localement élevé.

Méthodes de lutttes alternatives :

Favoriser les habitats des prédateurs :

- Créer des corridors écologiques (haies)
- Mettre en place des perchoirs pour les rapaces,
- Poser des nichoirs pour les chouettes,
- Créer des abris pour les mustélidés (hermine, fouine...)

Déranger le campagnol :

- détruire les galeries par le travail du sol.
- ne pas laisser les touffes d'herbes (zones de refuge des campagnols)
- contrôler les populations de taupes

Piéger massivement du printemps à l'automne :

- les pièges TOPCAT : piège à guillotine en acier.
- les pièges à pinces

Mettre en place des barrières mécaniques :

- des paniers en grillage autour de la motte du plant.
- l'enfouissement d'un grillage tout autour de la parcelle, couplé aux pièges.

• AUTRES RAVAGEURS DEGATS LOCALISES

• Les oiseaux

Les oiseaux constituent sur beaucoup de parcelles un fléau tout aussi important que la drosophile : étourneaux, corbeaux, merles, grives...

Les parcelles entourées d'arbres de hauts jets (pins, chênes...) sont souvent soumises à une pression très forte : jusqu'à plus de 10% de perte de fruits.



Dégâts d'oiseaux sur myrtilles : chute au sol, et fruits piqués.

Centre Val de Loire

15 juin 2026

(Crédit Photo : C. Savoure)

- **Les blaireaux**

Présence de blaireaux signalés sur une parcelle du réseau : ils mangent les fruits...

- **Les insectes phytophages**

Présence de quelques feuilles dévorées par des insectes phytophages : phyllobes, chenilles, cécidomyie...



**Attaques d'insectes phytophages.
Grand Est**

20/07/2026

(Crédit Photo : C. Barbier – Productrice)

A ne pas confondre avec des carences en calcium sur feuilles sur des arbres souvent poussant :



Carences en calcium sur feuilles

20/07/2026

(Crédit Photo : C. Barbier – Productrice)

• AUXILIAIRES

Les observateurs notent une présence de nombreux chrysopes.



Œuf de chrysope
Centre Val de Loire
20/07/2026

(Crédit Photo : C. Savouré, Productrice)

Œuf de Chrysope sur myrtille
Grand Est
29/06/2026
(Crédit Photo : J. Nogapoe, CA Nièvre)



• MAUVAISES HERBES

Les conditions sont favorables au développement des mauvaises herbes qui bénéficient de l'irrigation. Le risque est de favoriser la présence de la *Drosophila suzukii*. Présence de liseron qui grimpe sur les cannes des myrtilliers. Le risque est le dépérissement de l'arbre.



Développement des mauvaises herbes
(photo à gauche).

Maîtrise des adventices avec paillage toile tissée et miscanthus (photo à droite)

Centre Val de Loire

20/07/2026 2026

(Crédit Photo : C. Savoure, Productrice)

Evaluation du risque

Risque très élevé sur toutes les parcelles.

Note nationale BSV Abeilles - Pollinisateurs :



Le déclin des insectes pollinisateurs est ...

... une réalité mondiale impliquant de nombreux facteurs de stress notamment d'origine biologique, toxicologique, alimentaire et environnementale (climat, pertes d'habitats, érosion de la biodiversité florale...).

La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Abeilles- Pollinisateurs](#)

Note nationale Biodiversité 'Insectes Auxiliaires' :



La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Insectes auxiliaires](#)

Note nationale Biodiversité 'Araignées' :



La note est disponible sur le lien suivant : [Note nationale Araignées](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Myrtille National sont les suivantes :

Chloris Arbo, Ctifl, Chambres d'Agriculture du Lot et Garonne, de la Dordogne, du Sud Bretagne, de la Nièvre, de Côte d'Or, Cadrabret, Valprim, Gaïa Care, GIE des Monts du Velay, la Station Expérimentale d'Auray, Planète Légumes et Plantes et les agriculteurs observateurs de l'APMF (Association des Producteurs de Myrtilles de France)

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).